

نگاهتان را به روی هدف متمرکز سازید نه بر روی چیزهایی که موجب هراستان می شود.

آزمون بیماریهای واگیر پایه دوم

مورخه: ۱۳۹۰/۱/۲۸

دوره چهاردهم بهورزی

نام و نام خانوادگی:

- ۱- گزینه صحیح را با ص و غلط را با غ مشخص نمایید.
الف- ابتلا به سالک نوع مرطوب علیه نوع خشک ایمنی ایجاد میکند.
ب- ضایعات سالک در نوع روستایی معمولاً دردناک و خارش دار هستند.
ج- در مناطق آلوده به مالاریا بایستی بصورت ماهیانه از کلیه افراد تبار مشکوک نمونه خون تهیه شود.
د- تب راجعه شپشی همان تب بومی یا آندمیک است.
ه- در صورت مشاهده تب راجعه بخصوص از نوع شپشی ارجاع غیرفوری لازم است.
و- زنان در سه ماهه سوم بارداری نسبت به ابتلای کاندیازیس حساس خواهند بود.
ز- مخزن بیماری کاندیدیا از انسان می باشد.

- ۲- مخزن اصلی در لیشمانیوز نوع جلدی شهری عبارتست از؟
الف- سگ آلوده ب- انسان بیمار ج- پشه فلبوتوم د- جوندگان وحشی

- ۳- در مورد سالک جلدی تمام گزینه ها صحیح است بجز؟
الف- نوع شهری دوره کمون کوتاهتری نسبت به نوع روستایی دارد.
ب- در نوع روستایی انتقال معمولاً از مخازن حیوانی صورت می گیرد.
ج- انتقال از طریق گزش نوعی پشه خاکی صورت می گیرد.
د- لیشمانیا تروپیکا عامل نوع شهری است.

- ۴- در کدام یک از موارد زیر باید به بیماری سالم مشکوک شد؟
الف- برزو جوشهای چرکی در پوست
ب- برزو دانه های قرمز رنگ روی شکم
ج- پیدایش یک یا چند زخم جلدی در نقاط باز بدن که بیشتر از ده روز طول بکشد.
د- سیاه شدن نواحی انتهایی بدن

- ۵- مهمترین راه پیشگیری از بیماری سالک کدام است؟
الف- سمپاشی با حشره کشهای ابقایی
ب- از بین بردن سگهای ولگرد
ج- درمان انسان های آلوده و سگهای ولگرد
د- درمان انسانها و اتلاف سگهای ولگرد
۶- بیماری کالاآزار در ایران به چه شکلی گزارش شده است؟
الف- اپیدمیک ب- اسپورادیک ج- آندمیک د- پاندمیک

۷- بیماری مالاریا در اثر ابتلا به کدام یک از انگل های زیر خطرناکتر است؟

الف- فالسیپاروم ب- ویواکس ج- اووال د- مالاریه

۸- کدام یک از انواع انگل بیماری مالاریا در ایران وجود ندارد؟

الف- فالسیپاروم ب- اووال ج- ویواکس د- مالاریه

۹- در مورد بیماری مالاریا کدام گزینه صحیح است؟

الف- میزبان اصلی انگل مالاریا انسان است.

ب- مرحله تشکیل گامتوسیت های نر و ماده در بدن پشه آنوفل ماده اتفاق می افتد.

ج- پشه د ر اثر نیش زدن مقداری از شیزونتها را وارد بدن انسان می کند.

د- شیزوگونی خونی در داخل گلبولهای قرمز انسان اتفاق می افتد.

۱۰- نشانه های بالینی در بیماری مالاریا در اثر کدام یک از عوامل زیر بروز می کند؟

الف- در اثر حمله انگل به گلبول و رشد و تکثیر و پاره کردن گلبول قرمز

ب- در اثر برزو تب شدید و عرق فراوان بیمار

ج- زمانی که پشه آنوفل از بدن بیمار خونخواری می کند

د- بعد از لرز شدید و احساس سرما

۱۱- کدام یک از موارد زیر در پیشگیری و اقدامات بهورز در بیماری مالاریا نمی باشد؟

الف- سم پاشی اماکن ثابت و موقت برای مبارزه با آنوفل توسط بهورز

ب- آموزش به مردم در مورد علایم بیماری و راهها یانتقال و پیشگیری

ج- بیماریابی جمعیت تحت پوشش جهت تشخیص به موقع و انجام اقدامات لازم

د- پیگیری بیماران شناخته شده و تحت درمان و نظارت بردرمان تا بهبودی کامل

۱۲- در تهیه لام خون مالاریا فاصله مناسب بین گسترش ضخیم و نازک چند سانتی متر است؟

الف- ۰/۵ سانتی متر ب- یک سانتی متر ج- ۱/۵ سانتی متر د- ۲ سانتی متر

۱۳- گزینه صحیح کدام است؟ درمالاریای نوع

الف- ویواکس دو روز درمیان بروز می کند.

ب- فالسیپاروم یک روز درمیان بروز می کند.

ج- مالاریه تب یک روز درمیان بروز می کند.

د- اووال تب هر روز بروز می کند.

۱۴- شرح حال گرفته شده از بیمار مراجعه کننده به خانه بهداشت به شرح زیر می باشد. بیماری وی چیست و اقدام لازم

کدام است؟

مدت یک هفته است دچار تبهای شدید، عرق فراوان، لرز شدید و کاهش وزن شده و تب نیز در ساعات مخصوصی از شبانه روز به سراغ فرد می آید.

الف- تیفوئید. تهیه نمونه مدفوع و ارسال آن و پیگیری مرتب جهت پاسخ سریع آزمایش

ب- سل. تهیه سه نمونه خلط و ارسال نمونه ها

ج- مالاریا. ارجاع فوری فرد به مرکز بهداشتی درمانی

د- مالاریا. تهیه نمونه لام خون و ارسال آن و پیگیری مرتب جهت پاسخ سریع آزمایش

۱۵- مورد انتظار تهیه لام در خانه بهداشت با جمعیتی معادل ۱۳۰۰ نفر چقدر میباشد؟

الف- ۱۳ ب- ۲۶ ج- ۱۳۰ د- هیچکدام

۱۶- زوایای لازم جهت تهیه گسترش نازک لام خون عبارتست از؟

الف- ابتدا با زاویه ۳۰ درجه حرکت و سپس با زاویه ۴۵ درجه گسترش تهیه می شود.

ب- ابتدا با زاویه ۴۵ درجه حرکت و سپس با زاویه ۳۰ درجه گسترش تهیه می شود.

الف- ابتدا با زاویه ۴۵ درجه حرکت و سپس با زاویه ۶۰ درجه گسترش تهیه می شود.

الف- ابتدا با زاویه ۳۰ درجه حرکت و سپس با زاویه ۶۰ درجه گسترش تهیه می شود.

۱۷- گزینه نادرست در مورد بیماری تب راجعه کدام است؟

این بیماری دارای ناقل بوده و انتقال از شخص به شخص ندارد.

تب راجعه کنه ای از طریق گزش کنه های نرم که بیشتر در شبها خونخواری می کنند منتقل می شود.

کنه آلوده بدون تغذیه و خونخواری نمی تواند زنده بماند.

تب مهمترین علامت بیماری است.

۱۸- در بیماریابی پدیکلوز کدام مورد صحیح نمی باشد؟

الف- پشت گوش و پس سر در هنگام بیماریابی مورد توجه قرار گیرد.

ب- وجود غدد لنفاوی متورم و دردناک درنواحی پس سر و پشت گوش کمک کننده است.

ج- داروی انتخابی درمان شپش سر شامپوی پرمترین می باشد.

د- شپش فقط باعث خارش شدید پوست سر می شود و هیچ عارضه دیگری ندارد.

۱۹- گزینه صحیح را در مورد بیماری سیفلیس انتخاب نمایید.

الف- عامل بیماری به سهولت در اثر گرما، خشکی و مواد ضدعفونی کننده از بین می رود.

ب- بیمار یبیشتر در کشورهای جهان سوم دیده می شود.

ج- انتقال سیفلیس مادرزادی قبل از هفته چهارم حاملگی صورت می گیرد.

د- در سیفلیس مادرزادی آسیب جدی به جنین نمی رسد.

۲۰- گزینه صحیح در مورد بیماری سوزاک کدام است؟

الف- در درمان بیماری سوزاک نیاز به درمان شریک جنسی نیست.

ب- سوزاک حاد بدون عارضه در زنان اغلب به صورت سوزش و تکرر ادرار ظاهر می شود.

۲۱- گزینه صحیح در مورد بیماری کاندیدیازیس را انتخاب نمایید.

الف- گندزدایی و ضدعفونی ترشحات و لوازم ضروری است.

ب- تشخیص بیماری به کمک نشانه های بالینی صورت می گیرد.

ج- بیماری دیابت شانس بروز عفونت کاندیدیاز را افزایش می دهد.

د- ضایعات کاندیدیاز با حدود نامشخص، مرطوب، پوسته دار و اریتما می باشد.

۲۲- کدام یک از بیماریهای زیر از مادربه جنین قابل انتقال نمی باشد؟

الف- سرخجه ب- سوزاک ج- سیفلیس د- توکسوپلاسموز

۲۳- تعاریف زیر مربوط به کدام بیماری است. نام بیماری را بنویسید.

الف- بیماری انگلی مزمن است که به وسیله انگل تک یاخته درون سلولی ایجاد میشود.

ب- بیماری عفونی مزمن است که توسط تریپانماپادوم ایجاد می شود.

ج- بیماری تبار ریکتزیایی که از طریق حشره منتقل می شود.

۲۴- داروی اصلی در خط اول درمان بیماری سالک چیست ؟

۲۵- در فرم بیماریابی مالاریا کلمه تعقیب به چه معناست؟

۲۶- اشکال مهاجم انگل مالاریا را نام ببرید.

۲۷- مشخصات شانکر در بیماری سیفلیس را بنویسید.

۲۸- عامل اصلی انتشار بیماری سوزاک در جامعه چیست؟

گزینه نادرست کدام است؟

الف- آلودگی به شپش در همه جادیده می شود

ب- تنها مخزن این بیماری انسان است

ج- شپش سر و بدن ۷ روز در خارج از بدن میزبان بدون خونخواری زنده می ماند

د- لزومی به درمان افراد مرتبط با بیمار نیست حتی اگر یافته هایی مبنی بر آلودگی داشته باشد.

در بیماری مالاریا لرزهمزمان با کدام یک از گزینه های زیر اتفاق می افتد؟

الف- ورود اسپروژوئیت ها به بدن ب- ورود مروژوئیت ها به بدن

ج- خارج شدن مروژوئیتها از سلولهای نسج کبد

د- پاره شدن سلولهای قرمز انگل دار و بیرون ریختن مروژوئیتها در داخل خون

مخزن مهم بیماری لیشمانیوز احشایی کدام است؟

الف- گربه و گربه سانان ب- گوشتخواران وحشی ج- جوندگان وحشی د- انسان و سگ