

سؤالات آزمون بیماریهای منتقله از ناقلین و آب و غذا – تیر ماه ۹۴

۱-تعریف مورد مشکوک به وبا :

- الف - هر فردی که از منطقه آلوده آمده باشد
ب - هر فردی با اسهال حاد آبکی لعاب برنجی و بدون تب
ج - هر فرد ۲ سال و بالاتر با اسهال حاد آبکی بیش از سه بار در روز د - هر فرد با حداقل پنج بار دفع اسهال حاد آبکی در روز

۲-کدامیک از بیماریهای زیر مشمول گزارش کتبی می باشد .

- الف - وبا ب - بوتولیسم ج - طغیانهای ناشی از آب و غذا د - تیفوئید

۳-چند درصد از بیماران مبتلا به وبا بدون علامت هستند ؟

- الف - ۵ درصد ب - ۷۵ درصد ج - کمتر از ۲۰ درصد د - بیش از ۶۰ درصد

۴-سه داروی خط اول مورد استفاده در درمان وبا را نام ببرید ؟

۵-تعریف مورد مشکوک به سالک :

- الف-مورد مشکوک به همراه وجود سابقه اپیدمیولوژیک در منطقه یا سابقه ابتلا به سالک در همان محل و احتمال عود آن
ب-وجود پاپول یا هر نوع ضایعه پوستی منطبق با علائم بالینی به خصوص در نقاط باز بدن که بیش از ۱۰ روز طول کشیده باشد
ج-وجود پاپول یا هر نوع ضایعه پوستی منطبق با علائم بالینی به خصوص در نقاط باز بدن که بیش از ۱۴ روز طول کشیده باشد
د-ب و ج

۶-ناقل بیماری سالک در نوع شهری کدامیک میباشد ؟

- الف-فلبوتوموس پاپاتاسی ب-فلبوتوموس سرژانتی ب-فلبوتوموس کوکازیکوس د-فلبوتوموس الکساندری

۷-عامل و مخزن بیماری لیشمانیوز جلدی (نوع شهری) در ایران به ترتیب کدامیک میباشد ؟

- الف-لیشمانیا ماژور - انسان های مبتلا ب-لیشمانیا تروپیکا - جوندگان صحرائی ج-الف و ب د-هیچکدام

۸-مقاومت بالینی به کدام مورد گفته میشود ؟

- الف-موردی که ضایعه ۴ هفته پس از درمان کامل موضعی یا یک دوره درمان کامل سیستمیک هنوز فعال است
ب-موارد عود و شکست درمان که ۸ هفته بعد از حداقل دو دوره درمان کامل سیستمیک ضایعه فعال وجود داشته باشد .
ج-موارد عود و شکست درمان که ۴ هفته بعد از حداقل دو دوره درمان کامل سیستمیک ضایعه فعال وجود داشته باشد .
د-موارد عود و شکست درمان که ۴ هفته بعد از حداقل سه دوره درمان کامل سیستمیک ضایعه فعال وجود داشته باشد .

۹-مقدار مدت داروی تجویز شده در درمان سیستمیک سالک ؟

- الف - ۲۰ میلی گرم آنتی موان پنج ظرفیتی (آنتی موان خالص) به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز (حد اکثر سه آمپول در روز)
- ب- ۴۰ میلی گرم آنتی موان پنج ظرفیتی (آنتی موان خالص) به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز (حد اکثر سه آمپول در روز)
- ج- ۷۵ میلی گرم از گلوکانتیم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز (حد اکثر سه آمپول در روز)
- د- الف و ج صحیح است

۱۰- هدف نهایی برنامه حذف مالاریا در افق ۱۴۰۰ کدامیک میباشد ؟

الف- توقف موارد وارده از خارج ب- توقف موارد وارده از داخل ج - توقف انتقال محلی د- الف و ب

۱۱- تب سه روز یک بار بدخیم ، لرز، عرق، سرفه ، اسهال و ناراحتی تنفسی از علایم کدام نوع مالاریا می باشد ؟

الف - ویواکس ب- مالاریه ج- فالسیپاروم د- اواله

۱۲- بیمار ۲۵ ساله با تشخیص مالاریای فالسیپارم مراجعه مینماید کدام رژیم درمانی را تجویز مینمایید ؟

الف- کلروکین : روز اول ۲ قرص 300mg روز دوم ۴ قرص 600mg روز سوم ۴ قرص 600mg

ب- کلروکین : روز اول ۴ قرص 600mg روز دوم ۴ قرص 600mg روز سوم 2 قرص 300mg

ج- روز اول ۲ قرص آرتسونیت 100mg + ۳ قرص فنسیدار روز دوم ۲ قرص آرتسونیت 100mg روز سوم ۲ قرص آرتسونیت 100mg

د- روز اول ۲ قرص آرتسونیت 100mg روز دوم ۲ قرص آرتسونیت 100mg روز سوم ۲ قرص آرتسونیت 100mg

ایران تحصیل

irantahsil.org