

سئوالات بیماریها و اگیر ۲

- ۱- کودک ۱/۵ ساله ای بعلت داغ بودن بدن به خانه بهداشت مراجعه کرده در ارزیابی این کودک از لحاظ تب درجه حرارت کودک ۳۷/۱ درجه در ناحیه زیر بغل می باشد این کودک آبریزش بینی ، بثورات جلدي و نشانه های موضعي را ندارد به مدت ۲ روز است که داغ می باشد طبقه بندی و اقدام درمانی مناسب این کودک کدام گزینه می باشد ؟
 - الف- بیماری خفیف تب دار - ارجاع غیر فوري - دادن استامینوفن
 - ب- بیماری تب دار - ارجاع غیر فوري
 - ج- بیماری خفیف تب دار - پیگیری ۲ روز بعد - چه موقع بعدا برگردد.
 - د- بیماری خفیف تب دار - دادن استامینوفن - پیگیری بعداز ۲ روز
- ۲- کودک ۲/۵ ساله ای بعلت اسهال به خانه بهداشت آورده شده است این کودک ۱۶ روز است که اسهال دارد در معاینه پوست این کودک آهسته به حالت طبیعی بر میگردد و نشانه دیگری ندارد مهمترین اقدام درمانی که شما برای این کودک انجام می دهید چیست ؟
 - الف- ارجاع فوري به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی
 - ب- ارجاع فوري به مرکز بهداشتی درمانی
 - ج- جبران کم آبی با ORS
 - د- تغذیه مخصوص
- ۳- برای کودک ۳/۵ ساله با وزن ۱۱ kg که بعلت اسهال به خانه بهداشت آورده شده است در معاینه فرورفتگی چشم ها دارد ، بیقراری و تحریک پذیر می باشد و به مدت ۷ روز است که اسهال دارد چه مقدار ORS داده میشود ؟
 - الف- CC ۸۲۵ برای ۴ ساعت
 - ب- CC ۱۳۲۰ برای ۶ ساعت
 - ج- ۱۰۰ تا CC ۲۰۰ پس از هر بار مدفوع
 - د- CC ۸۸۰ برای ۴ ساعت
- ۴- در کدام يك از موارد دزیر بدون تزریق اولین نوبت آنتی بیوتیک کودک را ارجاع فوري می دهیم (فاصله تا مرکز درمانی بیش از يك ساعت)
 - الف- عفونت خفیف چشم
 - ب- خونریزی بند ناف
 - ج- احتمال عفونت باکتریال شدید
 - د- بیماری شدید تب دار
- ۵- کودکی بعد از ۲ روز برای پیگیری عفونت حاد گوش مراجعه کرده است . درجه حرارت این کودک ۳۸/۶ می باشد و درد در گوش دارد شما چه اقدامی برای این کودک انجام می دهید ؟
 - الف- دادن قطره استامینوفن توصیه به کامل کردن درمان با آنتی بیوتیک
 - ب- دادن قطره استامینوفن ارجاع به مرکز بهداشتی درمانی روستایی
 - ج- آموزش فیتیله گذاری - دادن استامینوفن و ارجاع به مرکز بهداشتی
 - د- دادن قطره استامینوفن و ارجاع فوري به نزدیکترین مرکز درمانی
- ۶- مقدار آب قند داده شده به کودک ۱/۵ ساله بعنوان اقدام لازم برای پیشگیری از پایین آمدن قند خون عبارتند از :
 - الف- ۳۰ تا CC ۵۰ هر يك ساعت
 - ب- ۳۰ تا CC ۵۰ هر ۲ ساعت
 - ج- ۵۰ تا CC ۱۰۰ هر يك ساعت
 - د- ۵۰ تا CC ۱۰۰ هر ۲ ساعت
- ۷- کودک ۳/۵ ساله ای بعلت گلودرد به خانه بهداشت مراجعه کرده و در ارزیابی این کودک درجه حرارت ۳۸/۵ دارد و در معاینه گلو قرمزی منتشر در حلق دیده میشود و غدد لنفاوی

- کودک بزرگ و دردناک می باشد این کودک آبریزش بینی و سرفه و خشونت صدا نیز دارد طبقه بندی و اقدام درمانی برای این کودک کدام گزینه می باشد ؟
- الف- بیماری خفیف تب دار - دادن استامینوفن - ۲ روز بعد پیگیری
ب- سرماخوردگی یا سرفه - دادن استامینوفن - ۵ روز بعد پیگیری
ج- گلودرد استرپتوکوکی - درمان ۱۰ روزه با آنتی بیوتیک - ۵ روز بعد پیگیری
۸- کودک ۴۰ روزه ای به علت برفک به خانه بهداشت آورده شده است طبقه بندی این کودک و اقدامات درمانی برای این کودک چه می باشد ؟
- الف- برفک دارد - درمان با نیستاتین - ۱۰ روز بعد پیگیری
ب- مشکل شیر خوردن دارد - درمان با قطره نیستاتین - ۵ روز بعد پیگیری
ج- مشکل شیر خوردن دارد - درمان با قطره نیستاتین - ۱۰ روز بعد پیگیری
د- برفک دارد - درمان با قطره نیستاتین - ۵ روز بعد پیگیری
- ۹- مدت زمان ممنوعیت از مدرسه هر یک از بیماریهای واکسیناسیون را مشخص نمایید ؟
- الف- تراخم
ب- ژیا رتیا
ج- هیپاتیت A
د- تیخال
- سؤالات بیماریهای واکسیناسیون دار

- ۱۰- کدام یک از اقدامات زیر در فرد مبتلا به زردخیم انجام نمی شود ؟
- الف- ارجاع غیر فوری موارد شدید بیماری و مواردیکه پس از یک دوره درمان بهبود نیافته
ب- پیگیری بیماری هر سه روز یک بار
ج- در مان براساس دارونامه با پنی سیلین V خوراکی
د- جداسازی فرد بیمار در منزل و سایر محیط ها و بخصوص مدارس و خوابگاهها
- ۱۱- در مورد بیماری مالاریا کدام گزینه صحیح می باشد ؟
- الف- میزبان اصلی انگل مالاریا انسان است .
ب- مرحله تشکیل گامتوسیت های نر و ماده در بدن پشه آنوفل ماده اتفاق می افتد .
ج- پشه در اثر نیش ردن مقداری از شیزونتها را وارد بدن انسان می کند .
د- شیزوگونی خونی در داخل گلبولهای قرمز انسان اتفاق می افتد .
- ۱۲- کودک ۷ ساله ای دچار بیماری گال شده است نحوه مصرف داروی لیندان برای درمان کودک به چه صورتی می باشد ؟
- الف- قبل از مصرف حمام کرده و سپس دارو را روی بدن از گردن به پایین بمالد و پس از ۲۴ ساعت بشوید .
ب- دارو را بصورت یک ورقه نازک از گردن به پایین روی پوست خشک مالیده و پس از ۲۴ ساعت بدن را بشوید .
ج- ابتدا حمام کرده و ۱۲ ساعت پس از مصرف دارو بدن را شسته و یک هفته بعد مجددا تکرار گردد .
د- دارو را از گردن به پایین بمالد (مخصوص قسمتهای چین دار بدن) و پس از ۱۲ ساعت بدن را شسته و یک هفته بعد مجددا تکرار کند .
- ۱۳- در مقابل هر یک از موارد (الف-ب-ج-د) بیماریهای مربوط (A، B، C، D) را انتخاب کنید ؟
- الف- احتمال ایجاد عوارض کلیوی A - ایدز-
ب- انتقال بیماری از طریق تزریق خون و فراوردههای خونی B - سوزاک-

- ج- مخمك - زردخم
د- مالاړيا- سيفليس

- ۱۴- کدام يك از كزينه هاي زير در مورد علائم مخمك صحيح نيست ؟
الف- بثورات مخمكي از روز دوم بيماري شروع ميشود .
ب- بثورات مخمكي در لمس زبر مي باشد وبرروي صورت نيز تشكيل ميشود .
ج- بثورات مخمكي علاوه بر پوست مخاط زبان را نيز گرفتار مي كند .
د- بثورات مخمكي به مدت ۱۰-۶ روز برروي بدن باقي مي ماند .

سئوالات بيماريهاي غير واگير

- ۱۵- در آزمایش دو ساعت پس از مصرف ۷۵ گرم گلوکز قند خون افراد اندازه گيري ميشود ؟
الف- قند خون ناشتا
ب- قند خون غير ناشتا
ج- تحمل قند
د- قند خون
- ۱۶- در طرح غربالگري ديابت کداميك از افراد زير در معرض خطر نمي باشند ؟
الف- شخص ۳۰ ساله اي كه فشارخون ۱۵۰ دارد .
ب- خانم بارداري با سن ۲۵ سال هفته ۱۲ بارداري
ج- آقاي ۲۸ ساله اي با BMI ۳۰ مي باشد .
د- خانم ۳۵ ساله اي سابقه مرده زايي دارد ودرضمن شوهر او ديابت دارد .
- ۱۷- انواع فشارخون عبارتند از :
الف- فشارخون اوليه - فشارخون ثانويه
ب- فشارخون طبيعي - فشارخون بالا
ج- فشارخون ماکزیمم- فشارخون مینیمم
د- فشارخون تیپ ۱ - فشارخون تیپ ۲
- ۱۸- کداميك از كزينه هاي زير جزو عوارض بيماري ديابت نمي باشد ؟
الف- كوري
ب- اغماء
ج- نقص عضو
د- افزايش وزن
- ۱۹- کدام كزينه در مورد اختلالات ناشي از كمبود يد صحيح مي باشد ؟
الف- مصرف روزانه نمك يeddar مي تواند گواتر وكرتينيسم را درمان نمايد .
ب- كمبود خفيف يد در دوران بارداري هيچ گونه عارضه اي براي كودك ايجاد نمي كند .
ج- اختلالات ناشي از كمبود يد از اوایل شیرخوارگی تا حدود ۵ سالگی دیده ميشود .
د- با مصرف نمك يeddar ميزان يد موردنياز بدن به راحتی تامين ميشود .
- ۲۰- کدام كزينه در مورد سوء تغذيه كواشيوكور صحيح نمي باشد ؟
الف- ضايعات مغزي كه در اثر سوءتغذيه ايجاد شده غير قابل جبران است .
ب- ادم قبل از آنكه در صورت واندامها ظاهر شود اغلب در احشاي داخلي ظاهر ميگردد .
ج- هرچه سن كودك در موقع ابتلا به بيماري پايين تر باشد آثار بيماري شديد خواهد بود .
د- اگر سوءتغذيه پيشرفت نمايد چربي زير پوستي از بين مي رود .
- ۲۱- کدام كزينه در مورد پيشگيري نوع دوم در بهداشت روان صحيح مي باشد ؟
الف- جلوگیری از ايجاد ضربه به سر يا عفونت هاي مغزي
ب- تشويق مردم به برقراري ارتباط دوستانه ومحبت آميز با يکديگر
ج- تشخيص زودرس بيماري ودرمان مناسب
د- کمک به بيماري براي بدست آوردن توانايي از دست رفته

- ۲۲- در صورت ابتلاي كودك به تشنج - يرقان - عفونت مغزي كودك به كداميك از اختلالات رواني عصبي مبتلا ميگردد؟
الف- اختلالات خفيف رواني - شديد رواني
ب- عقب ماندگي ذهني - صرع
ج- شديد رواني - عقب ماندگي ذهني
د- صرع - خفيف رواني



ایران تحصیل
irantahsil.org