

کم کاری تیروئید

۱. کدامیک از علائم کم کاری تیروئید نوزادان نمیباشد؟

الف- تولد بعد از هفته ۴۲ حاملگی، یرقان (زردی) طول کشیده، ادم در نوزادان

ب- مک زدن ضعیف، شیر نخوردن به مقدار کافی، کاهش درجه حرارت بدن

ج- صدای گریه نازک، بیض فعالی، پوست شفاف، اسهال

د- کبودی در انگشتان دست و یا مشکلات تنفسی وزن نگرفتن، یبوست

۲. مطمئن ترین محل نمونه گیری جهت غربالگری کم کاری تیروئید در نوزادان..... می باشد:

الف- بخش عقبی پاشنه پا ب- حاشیه کناری پاشنه پا ج- نرمه کناری دست د- قسمت میانی پاشنه پا

۳. کدامیک از حملات زیر صحیح است؟

الف- حداقل ۳ ساعت وقت لازم است تا نمونه در دمای اتاق کاملاً خشک شود.

ب- نمونه تهیه شده (کاغذ فیلتر) بایستی به صورت عمودی روی پایه مخصوص قرار گیرد.

ج- زمان انجام آزمایشات تیروئید برای کودک تحت مراقبت همراه در طول یکسال اول زندگی میباشد.

د- فرم شماره ۲ همان کارت مراقبت بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید نوزادی می باشد.

۴. بهترین زمان جهت شروع درمان نوزادان مبتلا به کم کاری تیروئید.....می باشد:

الف- بعد از یکماهگی ب- قبل از یکماهگی ج- قبل از یکسالگی د- قبل از ۳ماهگی

۵. در چه صورت (باتوجه به جواب آزمایش اول) نمونه گیری مجدد از پاشنه پا انجام میشود؟

الف- اندازه TSH کمتر از ۵ باشد. ب- اندازه TSH بیشتر از ۱۰ باشد.

ج- اندازه TSH بیشتر از ۲۰ باشد. د- اندازه TSH بین ۵ تا ۹/۹ باشد.

۶. اگر میزان TSH فیلتر پیر دوم مساوی و یا بیشتر از ۵ باشد:

الف- بلافاصله درمان شروع می شود. ب- یک هفته بعد نمونه مجدد تهیه می شود.

ج- بلافاصله جهت آزمایشات تکمیلی و سرمی به آزمایشگاه همکار یا منتخب شهرستان ارجاع میگردد.

د- جهت آزمایشات تکمیلی و سرمی یک ماه بعد به آزمایشگاه همکار یا منتخب شهرستان ارجاع میگردد.

۷. کدامیک از ویژگی های نمونه مناسب هیپوتیروئیدی نمی باشد؟

الف- لکه های خون بدون اثر انگشت باشند. ب- قطر لکه خون بیش از ۵ میلی متر نباشد

ج- دو لکه روی هم نباشد د- لکه خون از دو طرف همسان دیده شود

۸. از کدام مورد زیر آزمایش کم کاری مادرزادی تیروئید مجدداً انجام نمیشود؟

الف- نوزادان ترم ج- نوزادانی که داروهای خاص استفاده میکنند.

ب- نوزادی با وزن ۲۴۰۰ گرم د- نوزادانی که در بیمارستان بستری شده اند.

۹. نحوه مصرف صحیح داروی لووتیروکسین کدام است؟

الف- بهتر است نوزاد یک ساعت قبل از مصرف لووتیروکسین شیرمادر نخورد.

ب- مصرف همزمان شیرهای دارای ترکیبات سویا با لووتیروکسین بلامانع است.

ج- بین مصرف قطره آهن و لووتیروکسین حداقل ۸ ساعت فاصله باشد

د- دادن همزمان لووتیروکسین با آب میوه و غذای کمکی بلامانع است.

۱۰. از نوزاد با شماره فیلتر ۸۹۱۵۰۰۰۰۱، نمونه دوم تهیه گردیده است، شماره فیلتر پیر دوم که به او

داده می شود شماره خواهد بود:

الف- ۸۹۱۵۰۰۰۰۱/۲ ب- ۸۹۱۵۰۰۰۰۱/۱ ج- ۸۹۱۵۰۰۰۰۱ د- ۸۹۱۵۰۰۰۰۲

۱۱. در چه صورت با توجه به نتیجه آزمایش غربالگری کم کاری تیروئید کودک نیاز به ارجاع فوری

دارد؟

الف- اندازه TSH بیشتر از ۲۰ باشد. ب- اندازه TSH مساوی و بیشتر از ۲۰ باشد.

د- اندازه TSH بیشتر از ۱۹ باشد. د- اندازه TSH بیشتر از ۱۰ باشد.

۱۲. در مواردی که نیاز به نمونه گیری مجدد هیپوتیروئیدی وجود داشته باشد (بجز موارد ناشی از نقص در نمونه اول)، نمونه دوم بایستی در چه زمانی تهیه شود؟

الف- هفته سوم تولد ب- بعد از ۱۰ روزگی ج- یکماهگی د- قبل از ۱۰ روزگی

۱۳. میزان طبیعی TSH در نوزادان می باشد:

الف- ۵ ب- کمتر از ۵ ج- بین ۵ تا ۱۰ د- بین ۵ تا ۱۹/۹

۱۴. هنگام نمونه گیری نوزاد بایستی در وضعیتی قرار گیرد که :

الف- محل خونگیری بالاتر از سطح قلب قرار گیرد.

ب- محل خونگیری پایینتر از سطح قلب قرار گیرد.

ج- محل خونگیری همپراز سطح قلب قرار گیرد.

د- فرقی نمیکند محل خونگیری چه وضعیتی نسبت به قلب داشته باشد.

۱۵. دفتر غربالگری نوزادان کدامیک از فرمهای زیر می باشد؟

الف- فرم شماره ۱ ب- فرم شماره ۲ ج- فرم شماره ۴ د- فرم شماره ۳

سوانح و حوادث

۱. حداکثر ارتفاع پله حدود.....CM و حداقل عرض آن بایستی.....CM انتخاب گردد:

الف-۱۵-۲۵ ب-۱۸-۳۵ ج-۱۸-۳۰ د-۳۰-۱۵

۲. کدامیک از موارد زیر جز وظایف بهورز در خصوص حوادث نمی باشد؟

الف- تعیین علل ایجاد حوادث ب- اعمال مداخلات لازم در زمینه پیشگیری
ب- ثبت حوادث و تجزیه تحلیل اطلاعات د- اولویت بندی حوادث بر اساس میزان بروز و شدت حادثه

۳. کدامیک جزء حوادث غیر عمدی نمی باشد؟

الف- حوادث محیط کار ب- حوادث خانگی ج- حوادث در مدرسه د- خشونت

۴. اولین قدم در برنامه ایمنی می باشد:

الف- برنامه ریزی ب- شناسایی خطر ج- ارتقاء ایمنی د- آموزش

۵. ناگهانی بودن، ناخواسته بودن و خسارت بار بودن سه خاصیت می باشد:

الف- خطر ب- حادثه ج- آسیب د- الف و ب صحیح است.

۶. اتاقی دارای ۴ پریز و کلید برق می باشد که یکی از آنها فاقد درپوش ایمنی می باشد، نمره

آیتم مربوطه را در چک لیست ایمنی منزل چند می‌دهید؟

الف- یک ب- صفر ج- ۷۵٪ د- ۵٪

۷. حادثه خیزترین محل در منزل می باشد:

الف- حمام ب- آشپزخانه ج- بالکن د- راه پله

۸. سیل و زلزله جزء کدامیک از حوادث زیر می باشد:

الف- حوادث غیر عمدی ب- حوادث طبیعی

ج- ناخواسته د- الف و ب صحیح است