

- ۱- در صورت مرگ حیوانی بر اثر بیماری سیاه زخم بهترین روش دفن کدام است
 - الف- دفن در زمینی با پوشش لایه آهک زنده
 - ب- جدا کردن پشم بدن حیوان و استفاده از گوشت آن برای سگ
 - ج- دفن در زمینی به عمق ۲۰ سانتیمتر
 - د- همه موارد
- ۲- در مورد بیماری توکسوپلاسموز کدام صحیح نیست؟
 - الف- سن شایع ابتلا در جوانی است
 - ب- انتقال از طریق خوراکی، خون و جفت میباشد
 - ج- شایعترین علامت بزرگی غدد لنفاوی است.
 - د- کم خونی، بزرگی کبد و طحال از علائم بیماری است
- ۳- برای کنترل بیماری هاری چه اقداماتی انجام می شود
 - الف- واکسیناسیون سگها و گربه ها
 - ب- کنترل سگها
 - ج- اتلاف سگهای ولگرد
 - د- تمام موارد
- ۴- راههای انتقال بیماری شارین کدام است؟
 - الف- خوراکی
 - ب- تنفسی
 - ج- گزش حشرات
 - د- تمام موارد
- ۵- کدامیک از فراورده های زیر سبب انتقال بیماری تب مالت نمیشود
 - الف- شیر خام
 - ب- ماست
 - ج- خامه
 - د- پنیر
- ۶- مهمترین علامت بیماری تب مالت در دامها چیست
 - الف- سقط جنین
 - ب- تب
 - ج- کاهش اشتها
 - د- پنومونی
- ۷- برای پیشگیری از ابتلا به تب مالت کدام گزینه غلط است؟
 - الف- دفع بهداشتی فضولات دامی
 - ب- استفاده از ماسک و وسایل حفاظتی
 - ج- واکسیناسیون دامها
 - د- استفاده از جیک، فله و شیر نجوشیده
- ۸- در خصوص هاری کدام گزینه صحیح است
 - الف- لازمست محل زخم حیوان گزیده به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه شستشو شود
 - ب- شستشوی محل زخم ۵۰٪ از بروز بیماری پیشگیری میکند
 - ج- هزینه واکسیناسیون هر فرد ۹۰ هزار تومان میباشد.
 - د- تمام موارد
- ۹- مخازن هاری وحشی کدام است؟
 - الف) گربه و سگ
 - ب) گرگ، روباه و شغال
 - ج) گربه، سگ و روباه
 - د) هیچکدام
- ۱۰- اولین اقدام در گاز گرفتگی کدام است؟
 - الف) تازریق سرم ضد هاری
 - ب) تزریق واکسن
 - ج) شستشوی محل گاز گرفتگی با آب و صابون فراوان
 - د) همه موارد
- ۱۱- میکرو کلرا در کدام محیط مقاوم تر است؟
 - الف) یخ
 - ب) آب و میوه ها
 - ج) گرمای ۵۶ درجه
 - د) آب جوش
- ۱۲- کدامیک راههای انتقال وبا می باشد؟
 - الف) استحمام در آب آلوده
 - ب) شیر دادن کودک با بطری
 - ج) تهیه غذای سرد با آب آلوده
 - د) همه موارد
- ۱۳- در تشخیص تیفوئید کدام بهتر است؟
 - الف) کشت خون
 - ب) کشت مغز اسوتخان
 - ج) سرو لوژی
 - د) کشت مدفوع
- ۱۴- راههای انتقال بیماری شارین کدام است؟
 - الف- خوراکی
 - ب- تنفسی
 - ج- گزش حشرات
 - د- تمام موارد

۱۵- در مورد بیماری توکسوپلاسموز کدام صحیح نیست ؟

- الف- سن شایع ابتلا در جوانی است
ب- کم خونی ، بزرگی کبد و طحال از علائم بیماری است
ج- شایعترین علامت بزرگی غدد لنفاوی است.
د- انتقال از طریق خوراکی، خون و جفت میباشد

۱۶- در مورد کیست هیداتید کدام غلط است ؟

- الف- سگ از طریق خوردن کیست های موجود در جگر خام بیمار میشود
ب- انسان میزبان نهائی میباشد
ج- شایع ترین محل درگیری کبد است
د- علائم بالینی بستگی به محل کیست دارد
۱۷- کدام یک از بروسلاها بیماریزائی و اختلالات مفصلی بیشتری دارد

الف- ابرتوس ب- کانیس ج- ملی تنسیس د- سویس

۱۸- اقدامات لازم جهت پیشگیری از ابتلا به توکسوپلاسموز کدامند

- الف- گندزدائی روزانه لانه گربه
ب- دفع بهداشتی فضولات گربه
ج- عدم مصرفگوشت نیم پز پرندگان
د- همه موارد
۱۹- اهداف عمده برخورد با همه گیری وبا کدام است .

الف- کاهش مرگ و میر و پیشگیری
ج- توزیع آب بهداشتی و غذا
ب- قرنطینه و واکسیناسیون
د- همه موارد

۲۰- کدام گروه خونی بیشتر به بیماری التور مبتلا می شوند

الف- گروه خونی AB ب- گروه خونی O ج- گروه خونی A د- گروه خونی B

۲۱- مدت زمان بقای ویبریو کلرا در روده مگس چه مدت است

الف- بین ۴-۱ هفته ب- بین ۵-۴ روز

ج- بین ۱۰-۱ روز د- حداکثر تا یک ماه

۲۲ - کدام گزینه جهت پیشگیری از ابتلاء به وبا و اسهال خونی صحیح می باشد ؟

الف : جوشاندن یا کلرینه کردن آب آشامیدنی. ب : استفاده از غذای پخته شده .

ج : شستشوی دستها. د: همه موارد

۲۳- کدام گزینه غلط است ؟

الف :مورد وقتی مشکوک به وباست که هر فرد ۵ سال به بالا دچار دهیدراتاسیون شدید شود و یا در اثر اسهال آبکی شدید میرد.

ب : در مناطقی که همه گیری وبا وجود دارد و یا آندمیک می باشد مورد وقتی مشکوک به وباست که هر فرد ۵ سال به بالا اسهال حاد آبکی داشته باشد.

ج : مورد تأیید شده: هر فرد دچار اسهال که ویبریو کلرا ۵۱ یا ۵۱۳۹ از مدفوع اش جدا شده باشد.

د : در مناطقی که همه گیری وبا وجود دارد و یا آندمیک می باشد مورد وقتی مشکوک به وباست که هر فرد ۲ سال به بالا اسهال حاد آبکی داشته باشد.

۲۴- کدام گزینه در پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب صحیح می باشد ؟

الف : بهداشت آب ب:بهداشت مواد غذائی

ج :بهداشت فردی د: همه موارد

۲۵- بهترین زمان ممکن جهت گرفتن نمونه سوآپ مقعدی چه هنگامی است ؟

الف:به محض شروع اسهال ب:قبل از درمان اتی بیوتیکی

ج :در ۵ روز اولیه بیماری د:گزینه ب وج

۲۶- میزان کلر باقی مانده در تانکر های آب رسانی چند PPM است ؟

الف :۴/ ب :۶/ ج :۸/ د :۱

۲۷- آنتروپیا س ورمیکولاریس عامل کدما میک از بیماریهای زیر بوده وابتلا به ان را چه مینامند

الف- کرمک -اسکلروزیس ب- کرمک-آنتروپیا زیس ج- شیگلوز-شیگلوزیس د-وبا -اسکلرویدوز

۲۸- کدما میک از مطالب زیر در خصوص بیماری اکسیورزیس نادرست است.

الف- علائم بالینی مربوط به خارش اطراف پرینه و مقعد است ب- شایعترین راه انتقال بیماری دست بیماران بخصوص زیر ناخن هاست

ج- بیماری بیشتر در جاهای پر جمعیت وبزرگسالان دیده می شود د- بی خوابی وساییدن دندان از علائم بیماری کرمک است

۲۹- کدما میک از مطالب زیر در خصوص بیماری آسکاریس نادرست است.

الف- عامل بیماری لومبریکوئیدس می باشد ب- طول کرم ۲-۱۳ میلی متر میباشد

ج- آسکاریس در روده کوچک زندگی میکند د- بیشترین شیوع در کودکان ۸ساله است

۳۰- کدما میک از مطالب زیر در خصوص تخم انگل آسکاریس صحیح است

الف- تخم انگل در درجه حرارت ۱۰-۵ درجه سانتی گراد به مدت سه ماه زنده می ماند

ب- تخم انگل در عدم حضور اکسیژن سه ماه ودر رطوبت ماسه تا ۶سال زنده می ماند

ج- تخم انگل در عدم حضور اکسیژن تا ۶سال زنده می ماند د- الف وج

۳۱- کدام عبارت در خصوص مخزن تخم کرم آسکاریس صحیح است

الف- انسان ب- حیوانات ج- خاک د- الف وج

۳۲- تنیا ساژیناتا عامل کدما میک از انگلهای زیر میباشد

الف- آسکاریس ب- آمیبیازیس ج- شیگلوزیس د- کرم کدو

۳۳- آنتا مبا هیستولیتیکا عامل کدما میک از انگلهای زیر میباشد

الف- آسکاریدوز ب- آمیبیازیس ج- ژیا دیازیس د- اکسیور

۳۴- اشکال کیست سخت وتروفوزئیت از اشکال کدما میک از انگلهای زیر میباشد

الف- آمیبیازیس ب- ژیا دیازیس ج- آسکاریازیس د- شیگلوزیس

۳۵- در خصوص بیماری آمیبیازیس کدام عبارت صحیح است

الف- آبه های کبدی بیشتر در زنان دیده می شود ب- آبه های کبدی بیشتر در مردان دیده می شود

ج- در هر دو جنس به یک نسبت دیده می شود د- در ساکنین شهر بیشتر از روستائیان دیده می شود

۳۶- اسهال خونی (دیسانتری) از عوارض کدما میک ار انگلهای زیر است

الف- ژیا ردیا زیس ب- آمیبیازیس ج- آسکاریازیس د- شیگلوزیس

۳۷- بیشترین مرگ ناشی از شیگلوزیس در چه گروه سنی اتفاق می افتد

الف- کودکان زیر ۲سال ب- کودکان زیر ۵سال ج- کودکان زیر ۱۰سال د- جوانان

۳۸- استناتوره (اسهال چرب) از مشخصه کدام انگل میباشد

الف- اکسیورزیس ب- شیگلوزیس ج- آمیبیازیس د- ژیا ردیا زیس

۳۹- کدما میک از انگلهای زیر در یک طرف بدن بعنوان فلور طبیعی ودر طرف دیگر بعنوان انگل بیمارزا عمل میکند

الف- شیگلا ب- اشرشیا ج- ژیا ردیا د- الف وب

۴۰- تب پلکانی -برادیکاردی ولکه های گل سرخی شکل از علائم کدام بیماری است

الف- آمیبیازیس ب- حصبه ج- کزاز د- ژیا ردیا زیس

۴۱- در بیماری توکسوپلاسموز مادرزادی شایعترین ، شدیدترین و خطرناکترین عارضه رابنوسید

۴۲- مقدار سرم هاری برای فردی با وزن ۹۰کیلو گرم چند واحد، چند سی سی وچند ویال می باشد ؟

۴۳- شایعترین راه انتقال بیماری ccHF در ایران کدام است.

۴۴- کدام گزینه در خصوص بیماری ccHF صحیح نمی باشد؟

الف- ۸۰٪ موارد بدون علامت می باشد ب- کنه ها فقط ناقل بیماری هستند

ج- درمان بیماری می بایست در زمان محتمل شروع شود د- درمان بیماری می بایست در زمان محتمل شروع شود