



آزمون: آزمون فله شیب خرداد 1403 گروه روانپزشکی (روان تی)

مدت زمان: 120 دقیقه

زمان شروع آزمون: 09:00

آزمون مرتبط: روان تی

تعداد سوالات: 100

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

معمولی	0/000	0/000	1/000	کدامیک از روش های رویکردی زیر در فرآیند مشاوره های روانپزشکی مورد تاکید بیشتری قرار دارد؟	- 1
				جمع آوری اطلاعات پزشکی بیمار	(1)
				مصاحبه و معاینه با بیمار	(2)
				صحبت مستقیم با پزشک درخواست دهنده مشاوره	(3) ✓
				فورموله کردن تشخیص و طرح مدیریت بیمار	(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدامیک از عوامل دلیریومی زیر، کمتر تهدیدکننده حیات می باشند؟	- 2
				Hyperglycemia	(1) ✓
				Hyperthermia	(2)
				Hypoxia	(3)
				Hypothermia	(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدامیک از ترکیبات دارونی زیر با طولانی کردن فاصله QT ، کمتری همراه است؟	- 3
				Venlafaxin	(1)
				Olanzapin	(2) ✓
				Methadone	(3)
				Lithium	(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	بیماری که علاوه بر پارکینسون دچار دلیریوم شده است، تجویز کدامیک از داروهای زیر در اولویت کنترل این بیمار می باشد؟	- 4
				Molindone	(1)
				Risperidone	(2)
				Clozapine	(3) ✓
				Olanzapine	(4)

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	بیمار جوانی پس از انجام ECT دچار علائم دلیریوم آژیته همراه با رفتارهای انوماتیسم شده است. تجویز کدامیک از دستورات زیر برای این بیمار مفید است؟	- 5
				1) مراقبت از بیمار و کنترل علائم حیاتی	
				2) تجویز هالوپریدول (۲/۵-۵mg) به صورت I.V	
				3) تجویز میدازولام (۲-۵mg) به صورت I.V	✓
				4) تجویز دیازپام (۵-۱۰ mg) به صورت I.M	
معمولی	0/000	0/000	1/000	در افتراق بین اختلال ساختگی و تمارض کدامیک از جملات زیر درست است؟	- 6
				1) وجود درگیری قانونی به نفع اختلال ساختگی است.	
				2) سابقه اولیه از بیماری مزمن به نفع اختلال ساختگی است.	✓
				3) وجود ویژگی اختلال شخصیت وسواسی به نفع تمارض است.	
				4) وجود هویت های مختلف در بستری مراکز درمانی به نفع تمارض است.	
معمولی	0/000	0/000	1/000	در درمان سندرم Catatonic کدامیک از داروهای زیر کاربرد کمتری دارد؟	- 7
				1) Lorazepam	
				2) Clonazepam	✓
				3) Diazepam	
				4) Zolpidem	
معمولی	0/000	0/000	1/000	در انتخاب داروی آنتی سایکوتیک آتیپیک کدام گزینه صحیح است؟	- 8
				1) در بیمار با هایپرپرولاکتینمی بهترین انتخاب اولانزاپین است	
				2) در بیمار با اورتواستاتیک هایپوتشن الانزاپین و آریپیپرازول بهترین انتخاب است	✓
				3) کمترین عوارض اکستراپیرامیدال مربوط به الانزاپین و کوئتاپین است.	
				4) بهترین انتخاب در بیماران قلبی ریسپریدون و الانزاپین است	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	9 - کاربرد کدامیک از داروهای سه حلقه ای در بیماران افسرده دچار نارسایی قلبی ارجح تر است؟	(1) آمی تریپتیلین (2) ایمی پرامین (3) نورتریپتیلین ✓ (4) داکسپین
معمولی	0/000	0/000	1/000	10 - بیماری به دنبال پیوند کلیه دچار عفونت سیتومگالوویروسی شده است و پزشک معالج به دلیل مشاهده علانم مشابه افسردگی درخواست مشاوره با بخش روان تنی داده است . کدامیک از یافته های زیر در این بیمار بیشتر به سود تشخیص افسردگی است؟	(1) لتارژی (2) کاهش اشتها (3) دوری گرفتن از جمع (4) ناامیدی ✓
معمولی	0/000	0/000	1/000	11 - بیماری بدون سابقه تشنج در گذشته در بخش برای ترک الکل بستری شده است و در حین بستری دچار تشنج می شود، استفاده از کدامیک از داروهای زیر را برای درمان توصیه می کنید؟	(1) فنی تونین (2) والپروات سدیم (3) کاربامازپین (4) لورازپام ✓
معمولی	0/000	0/000	1/000	12 - در کدامیک از انواع دمانس توهمات بینایی و علانم خارج هرمی تابلوی غالب بالینی محسوب می شود؟	(1) Parkinson's Dementia (2) Vascular Dementia (3) Lewy Body Dementia ✓ (4) Binswager's Dementia

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

13 -	تجویز کدامیک از داروهای زیر از نظر تراتوژنیسیته در دوران حاملگی کم خطرتر است؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	لیتیوم				
(2) ✓	لاموتریژین				
(3)	کاربامازپین				
(4)	والپروات سدیم				
14 -	سیر آمنوره بیماران بی اشتهاپی عصبی با کدامیک از اشکال زیر محتمل تر است؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	معمولا اولین علامتی است که پس از درمان اختلال اولیه اصلاح می شود				
(2)	تا رفع همه علائم و بهبودی کامل اختلال اولیه آمنوره ادامه دارد				
(3)	اکثر بیماران ۴ ماه پس از بدست آوردن وزن مطلوب، مشکل آمنوره آنها برطرف می شود				
(4) ✓	اکثر بیماران ۶ ماه پس از بدست آوردن ۹۰٪ وزن مطلوب، مشکل آمنوره آنها برطرف می شود				
15 -	کدامیک از ترکیبات دارویی زیر برای درمان Bulimia Nervosa مورد تأیید FDA قرار گرفته است؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	Fluvoxamine 100mg/daily				
(2) ✓	Fluoxetine 60mg/daily				
(3)	sertraline 100mg/daily				
(4)	sertraline 50mg/daily				
16 -	بیماری که دو هفته پیش یک عدد آمپول فلوفازین دکانات برای اولین بار تزریق کرده است. و در حال حاضر به علت لکوسیتوز و تب بالا در بخش عفونی بستری شده است. پیدایش کدامیک از یافته های زیر احتمال ابتلا به NMS را کمتر می کند؟	1/000	0/000	0/000	معمولی

(1) ✓ افزایش آهن سرم

(2) افزایش CPK سرم

(3) افزایش تعداد ضربان قلب (تاکیکاردی)

(4) افزایش تعداد تنفس (تاکی پنه)

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

17 -	در رابطه با Inflammatory Bowel Disease (IBS) و روانپزشکی، همه موارد زیر درست است یحز؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	مطالعات بالینی نشان داده است که ۲۵٪ این بیماران، دارای اختلال اضطراب و افسردگی هستند				
(2)	اختلال افسردگی، در افراد با ابتلای جدید، کمتر از افراد با ابتلای قدیمی است.				
(3) ✓	استرس های حاد کوتاه مدت در قیاس با استرس طولانی مدت، تاثیر مخرب تری روی بیماران دارد.				
(4)	تنش واضطراب و تحریک پذیری در شروع بیماری، بیشتر است				
18 -	کدامیک از علائم زیر در افتراق سندرم کوشینگ از افسردگی صحیح است؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1) ✓	در سندرم کوشینگ بیمار صبح ها احساس بهتری دارد.				
(2)	در سندرم کوشینگ REM latency افزایش یافته است				
(3)	در سندرم کوشینگ Mood lability کمتر است				
(4)	در سندرم کوشینگ irritability کمتر است				
19 -	در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی که تحت درمان با لیتیوم می باشد، همه موارد زیر بعنوان ریسک فاکتور برای هیپوتیروئیدی محسوب می شوند یحز؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	جنسیت زن				
(2)	مدت زمان درمان با لیتیوم				
(3) ✓	سن پایین				
(4)	وجود آنتی بادی های ضد تیروئید				
20 -	برای بیمار در بخش قلب بدلیل بروز توهم بینایی مشاوره روانپزشکی درخواست شده است، کدامیک از داروهای تجویزی زیر در کاردکس دارویی بیمار می تواند باعث بروز توهم بینایی در وی شده باشد؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	کاپتوپریل				
(2) ✓	دیگوکسین				
(3)	مگز یلپتین				
(4)	آمیودارون				

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره سنجش
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	خانم ۴۲ ساله ای که کاندید عمل جراحی بای پس معده برای چاقی مفرط می باشد جهت مشاوره قبل عمل به درمانگاه روان تنی ارجاع گردیده است، کدام یک از موارد زیر کنتراندیکاسون انجام عمل جراحی می باشد؟	- 21
(1) unstable Depression (2) bulimia (3) substance abuse ✓ (4) Anxiety of surgery					
معمولی	0/000	0/000	1/000	در مصرف کدام یک از داروهای کموتراپی زیر تجویز TCA و SSRI کنتراندیکه است؟	- 22
(1) وین کریستین (2) تاموکسیفن (3) هیدروکسی اوره (4) پروکاربازین ✓					
معمولی	0/000	0/000	1/000	در درمان های روان شناختی اختلالات عملکردی دستگاه گوارش کدامیک از درمان های زیر موثرتر گزارش شده است؟	- 23
(1) تکنیک Relaxation موثرتر است (2) CBT(Cognitive Behavior therapy) (3) DIT(Dynamic Interpersonal Therapy) (4) تکنیک های فوق بدون تفاوت موثر هستند و مفید گزارش شده اند ✓					
معمولی	0/000	0/000	1/000	استرس حاد روانی، بر روی دستگاه قلبی عروقی، همه موارد زیر را ایجاد می کند بجز:	- 24
(1) Paradoxical Vasoconstriction (2) Impaired Vasoconstriction ✓ (3) Arterial Endothelial Dysfunction (4) Impaired Coronary Artery Blood Flow					

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

25 -	اصطلاح Health Anxiety Disorders در DSM V، تغییر یافته کدامیک از اختلالات زیر است؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	Somatization Disorders				
(2)	Pain Disorders				
(3) ✓	Hypochondriasis				
(4)	Body Dysmorphic Disorders				
26 -	در خصوص درمان افسردگی در بیماران با بیماری قلبی زمینه ای گزینه درست را مشخص نمایید؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	انفارکتوس حاد میوکارد یک کنتراندیکاسیون جهت درمان افسردگی می باشد				
(2)	نورتریپ تیلین در بیماران دچار نارسایی مزمن قلبی ممنوعیت دارد				
(3) ✓	نفازدون در بیمار دچار اختلال هدایتی قلبی بلامانع است				
(4)	در بیماران قلبی، داروهای محرک توصیه نمی شود				
27 -	بیمار آقای ۶۷ ساله با وزن ۵۴ کیلوگرم که بدنبال جراحی شکستگی سر فمور بصورت ناگهانی دچار پرخاشگری، بیقراری و حمله به پرستار گردیده است، سابقه قلبی رفتارهای مشابه توسط خانواده بیان نمی گردد ولی سابقه مصرف لووتیراستام، سدیم والپروات و سیتالوپرام را جهت علائم افسردگی دوقطبی داشته است، وابستگی دارویی بیمار به داروهای سداتیو مطرح نمی شود جهت مدیریت درمان بیمار گزینه نادرست را مشخص نمایید ؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	خط اول درمان این وضعیت، درمانهای غیر دارویی می باشد				
(2)	توصیه به جایگزینی داروی لووتیراستام می گردد.				
(3) ✓	خطر عوارض اکستراپیرامیدال در تزریق وریدی هالوپریدول بیشتر از تزریق عضلانی می باشد				
(4)	استفاده از هالوپریدول خوراکی قبل عمل بروز دلیریوم را کاهش می دهد				
28 -	در مورد عارضه تاردیو دیسکینزی بدنبال مصرف هالوپریدول گزینه مناسب را انتخاب نمایید ؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	مصرف هالوپریدول کمتر از ۶ ماه با خطر کم تاردیو دیسکینزی همراه است				
(2)	ویتامین E در درمان این وضعیت پیشنهاد می گردد.				
(3)	تترابنازین در درمان آن موثر می باشد.				
(4) ✓	تغییر دارو به کوپتاپین در درمان موثر نمی باشد				

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

29 -	اختلال در planning ,sequencing ,organization در آسیب کدام منطقه فرونتال مشاهده می شود؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	اربیوفرونتال				
(2) ✓	دورسولترال				
(3)	لوب فرونتال چپ				
(4)	لوب فرونتال راست				
30 -	در خصوص مشکلات روانپزشکی کم کاری و پرکاری تیروئید گزینه نادرست را انتخاب نمایید؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	پارانویا در هر دو اختلال گزارش می گردد				
(2)	کاهش T4 بدنبال درمان موفق افسردگی با کاربامازپین مشاهده می شود				
(3)	توهم شنوایی و بینایی در myxedema madness گزارش می گردد				
(4) ✓	خطر هیپوتیروئیدی در جوانان تحت درمان با لیتیم بیشتر می باشد				
31 -	برای مرد ۳۹ ساله ای که دچار سوختگی ۳۰ درصدی گردیده، مشورت روانپزشکی جهت کنترل درد و اضطراب درخواست شده است، بیمار برای درد نمره ۸ از ۱۰ را در هنگام تعویض پانسمان روزانه گزارش می کند ، کدام درمان دارویی زیر برای بیمار مناسب نیست ؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	مورفین				
(2)	استامینوفن				
(3)	میدازولام				
(4) ✓	مپریدین				
32 -	مراجع خانم ۴۸ ساله ای است که با شکایت درد در ناحیه فک، احساس تغییر مزه غذا، سوزش زبان و خشکی دهان از ۶ ماه قبل توسط دندانپزشک ارجاع گردیده است، معاینه دهان و دندان مشکل خاصی نداشته است ، در خصوص اقدام مناسب تشخیصی- درمانی گزینه نادرست را انتخاب نمایید؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	somatization در همراهی با این اختلال گزارش می گردد				
(2)	Habit awareness counseling را به عنوان گزینه درمانی می توان انتخاب نمود				
(3) ✓	اتیولوژی اصلی بیماری بهداشت ضعیف و عفونت قارچی دهان می باشد				
(4)	آهن، فولات و ویتامینهای گروه B در درمان بیماری به کار می روند.				

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	در کدامیک از بیماریهای ذیل خطر خودکشی بیشتر می باشد؟	- 33
				(1) اپی لپسی	
				(2) آسیب نخاع	
				(3) ☒ بیمای زخم معده	
				(4) لوپوس SLE	
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدام گزینه از موارد کمتر اندیکاسیون نسبی پیوند نمی باشد؟	- 34
				(1) ☒ اختلال شخصیت که با تیم درمانی در روند درمان مداخله ایجاد کند	
				(2) محکومیت قضایی	
				(3) افکار خودکشی	
				(4) دمانس	
معمولی	0/000	0/000	1/000	در کدامیک از داروهای ضد افسردگی ذیل خطر سمیت کبدی بیشترین است؟	- 35
				(1) بوپروپیون	
				(2) ☒ دولوکستین	
				(3) پاروکستین	
				(4) ترازودون	
معمولی	0/000	0/000	1/000	در بیماری که تحت درمان جراحی بای پس معده برای کاهش وزن قرار گرفته و همزمان تحت درمان دارویی برای افسردگی نیز می باشد، جذب کدامیک از داروی های ذیل بدنبال عمل جراحی افزایش پیدامی کند؟	- 36
				(1) سیتالوپرام	
				(2) ونلافاکسین	
				(3) پاروکستین	
				(4) ☒ بوپروپیون	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

37 -	در نارسایی خفیف کلیوی ($GFR > 50 \text{ ml/min}$) کدامیک از داروهای ذیل نیاز به کاهش دوز دارد ؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1) ✓	ونلافاکسین				
(2)	پاروکستین				
(3)	لیتیم کربنات				
(4)	کاربامازپین				
38 -	در بیماری که ۴ هفته قبل دچار انفارکتوس میوکارد شده است و همزمان واجد علائم اختلال افسردگی است ؛ درمان دارویی مناسب را انتخاب نمایید ؟	1/000	0/000	0/000	تذکر
(1)	سیتالوپرام				
(2) ✓	سرترالین				
(3)	بوپروپیون				
(4)	دولوکستین				
39 -	در بیماری که با سابقه درمان ضد افسردگی با داروی سیتالوپرام و شکایت سندرم پای بی قرار مراجعه کرده است، مداخله نادرست درمانی را مشخص نمایید ؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	بررسی بیمار از نظر آنمی فقر آهن و دیابت				
(2) ✓	تداوم درمان با سیتالوپرام جهت بهبود افسردگی				
(3)	در نظر داشتن کلونازپام به عنوان گزینه درمانی				
(4)	انتخاب گاباپنتین به عنوان درمان دارویی				
40 -	بیمار آقای ۳۳ ساله ای است که بدنال ۴ روز مصرف همزمان سرترالین (۱۰۰ میلی گرم) و کلومیپرامین (۵۰ میلی گرم) دچار علائم بصورت تعریق، بی قراری، ترمور و تاکی کاردی گردیده است ، مداخله درمانی نادرست را مشخص نمایید ؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	قطع سرترالین و کلومیپرامین				
(2)	استفاده از کلونازپام جهت کنترل میوکلونوس و آذیتاسیون بیمار				
(3) ✓	تجویز سیپروهیتادین به عنوان خط اول درمان دارویی				
(4)	استفاده از cooling blanket جهت درمان هیپرترمی بیمار				

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	در افتراق کاتاتونی و سندرم نورولپتیک بدخیم (NMS) گزینه نادرست را مشخص نمایید ؟	- 41
				1 ✓ تاکی پنه و تاکی کاردی و لوکوسیتوز در کاتاتونی شیوع بیشتری از NMS دارد 2 رژیڈیتی و مونیسیم در هر دو اختلال وجود دارد 3 افزایش CPK (کراتین فسفوکیناز) در NMS از کاتاتونی شایعتر است 4 لورازپام در مدیریت درمانی هر دو اختلال کاربرد دارد.	
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدامیک از داروهای ذیل منجر به افزایش سطح سرمی لیتیم نمی شود ؟	- 42
				1 تتراسکلین 2 مترونیدازول 3 ✓ اسپرین 4 celecoxib	
معمولی	0/000	0/000	1/000	در بیمار دچار بیماری کبدی کدام داروی بنزودیازپین انتخاب مناسب تری است ؟	- 43
				1 ✓ اکسازپام 2 دیازپام 3 کلونازپام 4 کلردیازپوکساید	
معمولی	0/000	0/000	1/000	گزینه نادرست درمان در مادر باردار دچار اختلال پانیک را مشخص نمایید ؟	- 44
				1 ✓ روان درمانی با توجه به تاخیر پاسخ درمانی ارزش پابینی دارد. 2 درمان با داروهای TCA در حین بارداری بلامانع است. 3 شواهد آسیب پری ناتال در مصرف کلونازپام اندک است. 4 استفاده از بنزودیازپین در سه ماهه اول خطر شکاف کام را افزایش می دهد.	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

تراز	0/000	0/000	1/000	کدامیک در کنترل درد فیبرومیالژیا کاربرد دارد ؟	- 45
بوسپیرون				(1)	
ترازدون				(2)	
ونلافاکسین				(3) ✓	
فلوکستین				(4)	
معمولی	0/000	0/000	1/000	در خصوص شیوع اختلالات روان در بیماران جسمانی گزینه درست را مشخص نمایید؟	- 46
افسردگی در بیمارستان ژنرال ۲ برابر جامعه می باشد				(1)	
افسردگی ریسک فاکتور بیماری قلب نمی باشد				(2) ✓	
دلیریوم پروگنوز بستری را ضعیف می کند				(3)	
دلیریوم خطر اقامت در مراکز نگهداری را افزایش می دهد				(4)	
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدامیک از وظایف روانپزشک رابط-مشاور نادرست بیان شده است ؟	- 47
اخذ سابقه روانپزشکی و رشدی بیمار				(1)	
تمرکز مصاحبه بر دلیل مشاوره				(2)	
ارتباط با تیم درمان در خصوص علت درخواست مشاوره				(3)	
انجام معاینات کامل جسمانی در خصوص مورد مشاوره				(4) ✓	
معمولی	0/000	0/000	1/000	در خصوص درمان افسردگی در فرد دچار بیماری زمینه ای جسمی گزینه نادرست را مشخص نمایید؟	- 48
درمان بر مبنای علائم فعال بیمار				(1)	
سنجیدن عوارض جانبی و تداخلات دارویی				(2)	
در نظر گرفتن هزینه کلی درمان بیماری روان و جسمی				(3) ✓	
اطلاع از وضعیت قلب ، کبد و سیستم کلیوی بیمار				(4)	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم پاسخ
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	در خصوص مراقبت مشارکتی در طب روان تنی گزینه درست را مشخص نمایید ؟	- 49
				آموزش پزشکان مراقبت های اولیه در دراز مدت برای درمان افسردگی جامعه موثر است.	(1) ✓
				مراقبت مشارکتی باعث بهبود کمپلایانس درمانی بیماران افسرده می گردد.	(2)
				مراقبت مشارکتی در درمان اختلال افسردگی بیماران دچار بدخیمی موثر است.	(3)
				محل انجام مراقبت های مشارکتی در مراکز مراقبت های اولیه است.	(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	در بیمار جوان ۲۰ ساله تهرانی که بدنبال ۲ ماه خدمت سربازی در ایرانشهر با تشخیص اسکیزوفرنی بستری گردیده است ، در خصوص رابطه استرس و بیماری گزینه نادرست را مشخص نمایید؟	- 50
				استرس در سیر کلی بیماری فرد موثر است	(1)
				استرس بین فردی در عود بیماری موثر است	(2)
				خطر عود در "هیجان ابراز شده " افزایش دو برابری دارد	(3)
				استرس در پاتوژنز و شکل گیری بیماری موثر بوده است.	(4) ✓
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدام مقیاس مناسب برای شناسایی بیماران طبعی واجد شرایط درمان پیشگیری از افسردگی می باشد؟	- 51
				HADS	(1) ✓
				Hamilton	(2)
				GHQ	(3)
				Beck	(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	آقای ۴۳ ساله مبتلا به کانسر به دنبال درمان هورمون ضد سرطان دچار کاهش بینایی شده است. کدام درمان می تواند در ایجاد این حالت دخیل باشد؟	- 52
				سیکلوسپورین	(1) ✓
				متوترکسات	(2)
				تاموکسیفن	(3)
				کورتیکواستروئید	(4)

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	53 - خانمی ۳۵ ساله با BMI=35 برای کاهش وزن تحت درمان با لورکاسرین می‌باشد. طی یک ماه اخیر دچار خلق افسرده، کاهش انرژی، ناامیدی و اختلال در خواب شده است. درمان مناسب برای ایشان کدام است؟	(1) (2) (3) ✓ (4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	54 - کدام بیمار زیر کاندید مناسب تر برای جراحی باریاتریک جهت کاهش وزن می‌باشد؟	(1) (2) (3) ✓ (4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	55 - کدام گزینه از ریسک فاکتورهای افزایش دهنده خودکشی در افراد تحت درمان جراحی چاقی می‌باشد؟	(1) (2) (3) ✓ (4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	56 - مردی مبتلا به obesity برای شروع درمان روانشناختی کاهش وزن تحت مصاحبه روانشناختی قرار گرفته است. وی سابقه چند اقدام ناموفق برای کاهش وزن در گذشته داشته است و طی چند ماه اخیر کاهش وزن مختصری داشته است. در حال حاضر ذکر می‌کند که می‌خواهد از ماه آینده به طور جدی رژیم غذایی را رعایت کند. وی از نظر روانشناختی در کدام مرحله از تغییر است؟	(1) (2) ✓ (3) (4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	57 - در صورتی که هر گونه پیشنهاد ، انتقاد یا شکایتی از نحوه عملکرد مجموعه دارید، می توانید از طریق ایمیل info@irantahsil.org با ما در ارتباط باشید.	(1) (2) ✓ (3) (4)

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره غلط
نمره عدم
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	استاندارد طلایی درمان اختلال پر خوری کدام است؟	- 57
				ACT	(1)
				CBT	(2) ✓
				IPT	(3)
				Analytic psychotherapy	(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدام دارو در درمان آنژیواکم مزمن موثرتر است؟	- 58
				دوکسپین 10mg سه بار در روز	(1) ✓
				دیفن هیدرامین 25mg سه بار در روز	(2)
				سرتالین 100mg دوبار در روز	(3)
				دولوکستین 60mg چهار بار در روز	(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	آقای ۳۷ ساله از طرف درماتولوژیست با خارش مزمن از دو سال پیش به شما ارجاع شده است. در بررسی های درماتولوژیست دلیلی برای خارش پیدا نشده است. کدام یک از موارد زیر در شرح حال به نفع خارش سایکوزنیک می باشد؟	- 59
				خارش همراه با خلق پایدار که منجر به بیدار شدن از خواب می شود	(1)
				عدم وجود حملات خارش شبانه و وجود دوره های بدون علامت	(2) ✓
				همراهی خارش با آلودینی و هیپرپاتی	(3)
				سیر حمله ای در حد ۴۰ ثانیه و پایان ناگهانی همراه با درد	(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدام یک از اختلالات زیر با اختلال کنترل و تریکوتیلومانیا کوموریدیتی دارد؟	- 60
				اختلالات خلقی	(1)
				اختلالات شخصیت کلاستر A	(2) ✓
				اختلالات شخصیت کلاستر C	(3)
				اختلالات خوردن	(4)

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره سنجش
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

61 -	طبق دسته بندی DSM5 کدام یک از اختلالات زیر جز اختلالات شکایات جسمی نیست؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	اختلال اضطراب بیماری				
(2) ✓	اختلال بد ریخت انگاری بدن				
(3)	هیپوکندریازیس				
(4)	اختلال عملکردی نورولوژیک				
62 -	در تصویربرداری بیماران با Somatic pain disorder کدام یافته زیر محتمل است؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1) ✓	کاهش ماده خاکستری قشری در قسمت های تنظیم کننده حس درد در مغز				
(2)	کاهش حجم پوتامن				
(3)	افزایش حجم ماده خاکستری قشری در قسمت های تنظیم کننده حس درد در مغز				
(4)	تغییر حجم Basal ganglion				
63 -	خانمی ۲۴ ساله به دنبال سوختگی ۳۵٪ در تنه و اندام ها دچار درد شدید و اضطراب شده است. مشورت روانپزشکی برای کنترل درد درخواست شده، انتخاب شما چیست؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1) ✓	مورفین + میدازولام				
(2)	گاباپنتین + الانزابین				
(3)	پره گابالین + لورازپام				
(4)	اکسی کدون + الانزابین				
64 -	آقای ۵۴ ساله به علت حملات پانیک تحت درمان قرار گرفته است و بعد از مدتی دچار حساسیت پوستی به نور شده است. داروی مصرفی کدام است؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	لورازپام				
(2)	آلپرازولام				
(3) ✓	سیتالوپرام				
(4)	گاباپنتین				

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	65 - در بیماری که تحت درمان با کورتیکواستروئید قرار گرفته است. قوی‌ترین عامل پیش بینی کننده احتمال مانیا و سایکوز کدام است؟	(1) (2) (3) ✓ (4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	66 - خانمی جوان مبتلا به سایکوز و تحت درمان با ریسپریدون روزانه ۸ میلی گرم، بعد از ۶ ماه دچار هیپرپرولاکتینمی شده است. چگونه بیمار را مدیریت می کنید؟	(1) (2) (3) ✓ (4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	67 - کدام روان درمانی برای مبتلایان IBS انتخابی نیست؟	(1) (2) (3) ✓ (4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	68 - کدام سبک دلبستگی در مبتلایان به دیابت باعث پروگنوز بدتر درمانی می شود؟	(1) ✓ (2) (3) (4)

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره پاسخ صحیح
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	آقای ۲۴ ساله معتقد است مبتلا به انگل پوستی می باشد و با وجود اینکه در بررسی های کامل توسط درماتولوژیست بیماری پوستی رد شده همچنان مراجعات مکرر به پزشک دارد. کدام دارو در مدیریت این اختلال بیشترین اثر را دارد؟	- 69
ریسپریدون				(1)	
هالوپریدول				(2)	
پیموزاید				(3) ✓	
الانزاپین				(4)	
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدام یک از ریسک فاکتورهای "اختلال شناختی پایدار" پس از بیماری بحرانی نمی باشد؟	- 70
سن بالا				(1)	
اختلال تنظیم گلوکز				(2)	
کاهش فشار خون				(3)	
عملکرد کبدی مختل				(4) ✓	
معمولی	0/000	0/000	1/000	شما به عنوان روانپزشک رابط- مشاور در تیم درمانی مبتلایان به کانسر حضور دارید. برای کدام بیمار "عدم افشای کامل بیماری" گزینه مناسب است؟	- 71
بیماران به شدت ترسیده و وابسته				(1) ✓	
بیماران با سابقه مشکل سایکاتری				(2)	
مبتلایان به سوء مصرف مواد				(3)	
بیماران مسن				(4)	
معمولی	0/000	0/000	1/000	مکانیسم اثرات ضد درد داروهای آنتی دپرسانت کدام است؟	- 72
تقویت فعال شدن نورون های مهار کننده درد در سطح شاخ پشتی نخاع				(1) ✓	
اثر مستقیم بر قشر مغز در منطقه درک احساس درد				(2)	
مهار درد در منطقه پوتامن				(3)	
مهار درد در سطح نورونهای حسی				(4)	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	کدام دارو در درمان نوروپاتی دیابتی موثر نمی باشد؟	- 73
				(1) اکس کاربازپین (2) لاموتریزین ✓ (3) توپیرامات (4) پرگابالین	
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدام یک از موارد زیر برای روانپزشک رابط-مشاور برای واکنش شدید و انزجاری نسبت به بیمار تحت مراقبت، عامل خطر نمی باشد؟	- 74
				(1) ابتلا روانپزشک رابط-مشاور به افسردگی (2) ترس روانپزشک رابط-مشاور از مرگ و ناتوانی (3) وجود ویژگی های خودشیفته در بیمار ✓ (4) بیمار را مانند فرد دیگری در زندگی خود می بیند	
معمولی	0/000	0/000	1/000	خانمی ۴۸ ساله با شکایت خشکی دهان مراجعه کرده است. وی به علت اضطراب تحت درمان با سرتالین و کلونازپام می باشد و علل مدیکال خشکی دهان برایش رد شده است. کدام توصیه برای بیمار مناسب تر است؟	- 75
				(1) نوشیدن مکرر جرعه های آب، مصرف آدامس بدون قند، افزایش دوز سرتالین (2) عدم مصرف کافئین و الکل، مصرف آدامس بدون قند، تجویز پیلوکارپین ۱۰ mg دوبرار در روز ✓ (3) نوشیدن مکرر جرعه های آب، مصرف آبنبات، تجویز بتانکول خوراکی (4) تجویز کلونازپام و سرتالین در دوزهای منقسم	
معمولی	0/000	0/000	1/000	آقای ۳۴ ساله مبتلا به وابستگی به الکل و اضطراب، تحت درمان با دولوکستین 60mg و پرگابالین 75mg می باشد، در آزمایشات اخیر ALT:120, AST:90 بوده است. تصمیم شما برای بیمار چیست؟	- 76
				(1) کاهش دوز دولوکستین به ۳۰ mg و عدم تغییر دوز پرگابالین (2) کاهش دوز دولوکستین به ۳۰ mg و پرگابالین به ۵۰ mg (3) قطع تدریجی دولوکستین و پرگابالین و شروع سرتالین و گاباپنتین (4) قطع تدریجی دولوکستین و شروع سیتالوپرام ✓	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	خانمی جوان با سابقه پره اکلامپسی در حاملگی اول، در هفته ۳۸ حاملگی دوم با فشار بالا در بیمارستان بستری و متعاقباً زایمان سالم داشته است. هنگام ترخیص با وجود اطمینان بخشی، ترس شدید از فشار خون بالا در منزل دارد. کدام توصیف برای وی مناسبتر است؟	- 77
Psychological reaction to medical condition					(1) ✓
Medical presentation of psychiatric condition					(2)
Psychiatric complication of medical condition					(3)
Psychiatric presentation of medical condition					(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	در مصاحبه روانپزشکی با آقای ۸۰ ساله، وی در پاسخ به تمام سوالات یک کلمه را تکرار میکند. وی مبتلا به کدام اختلال فرم فکر است؟	- 78
Loose of associations					(1)
Preservation					(2) ✓
Echolalia					(3)
Thought- blocking					(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدام تست برای ارزیابی شخصیت به کار نمی رود؟	- 79
TAT					(1)
Rorschach					(2)
TOPF					(3) ✓
MCMI					(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	آقای ۶۳ ساله با سابقه هیپرلیپیدمی و تشنج به دنبال انفارکتوس میوکارد در ۳ ماه قبل، اکنون دچار علائم افسردگی و کندی سایکوموتور شده است. کدام درمان برای وی مناسب تر است؟	- 80
بوپروپیون					(1)
سرترالین					(2) ✓
میرتازاپین					(3)
آمی تریپتیلین					(4)

 ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۷

 irantahsil_moshaver

در صورتی که هر گونه پیشنهاد ، انتقاد یا شکایتی از نحوه عملکرد مجموعه دارید، می توانید از طریق ایمیل info@irantahsil.org با ما در ارتباط باشید.

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره پاسخ صحیح
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	در مبتلایان به دلیریوم اختلال اصلی در کدام حیطه است؟	- 81
ATTENTION				(1) ✓	
ORIENTATION				(2)	
HALLUCINATION VISUAL				(3)	
AGITATION				(4)	
معمولی	0/000	0/000	1/000	در دلیریوم کدام اختلال نوروترنسمیتری وجود دارد؟	- 82
هیپودوپامینرژیا - هیپوکولینرژیا				(1) ✓	
هیپودوپامینرژیا - هیپوکولینرژیا				(2)	
هیپودوپامینرژیا - هیپرکولینرژیا				(3)	
هیپودوپامینرژیا - هیپرکولینرژیا				(4)	
معمولی	0/000	0/000	1/000	برای بیماری terminally ill بستری در بخش عفونی، با تحریک پذیری شدید، بیقراری، عدم توجه، دیس اوریاتاسیون که شبها شدیدتر می شود، مشورت درخواست شده است. شما کدام درمان را انتخاب می کنید؟	- 83
هالوپریدول وریدی				(1) ✓	
هالوپریدول عضلانی				(2)	
لورازپام خوراکی				(3)	
لورازپام تزریقی				(4)	
معمولی	0/000	0/000	1/000	برای درمان اُزیتاسیون بیمار دچار دلیریوم بستری در ICU که به درمانهای روتین پاسخ نداده است، کدام گزینه مناسب تر است؟	- 84
Propofol- paliperidone				(1)	
High dose BZD				(2)	
Dexmedetomidine- levetiracetam				(3)	
Propofol- Dexmedetomidine				(4) ✓	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره پاسخ صحیح
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	درمان خط اول برای Benign Essential Tremor کدام است؟	- 85
(1) Primidon (2) ✓ Propranolol (3) Alprazolam (4) gabapentine					
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدام نوع ترمور در drug-induced parkinsonism دیده می شود؟	- 86
(1) Fine- high frequency- resting tremor (2) ✓ Coarse- low frequency- resting tremor (3) Coarse- high frequency-postural tremor (4) Fine- low frequency- postural tremor					
معمولی	0/000	0/000	1/000	بیماری به دنبال مصرف طولانی مدت ریسپریدون به میزان ۸ mg روزانه، علائمی به نفع تاردیو دیسکینزیا دارد. چگونه اختلال را مدیریت می کنید؟	- 87
(1) کاهش دوز ریسپریدون به ۴ mg و افزودن تترابنازین (2) قطع ناگهانی ریسپریدون و شروع کلوزاپین (3) قطع ناگهانی ریسپریدون و شروع تترابنازین (4) ✓ کاهش تدریجی و قطع ریسپریدون و شروع کلوزاپین					
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدام داروی در درمان Erectile Dysfunction طول اثر طولانی تری دارد؟	- 88
(1) سیلدنافیل (2) واردنافیل (3) ✓ تالادافیل (4) آوانافیل					

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	Squeeze Technique روش مناسب برای درمان کدام اختلال جنسی است؟	- 89
				Male hypoactive sexual desire	(1)
				Erectile disorder	(2)
				Premature ejaculation	(3) ✓
				Arousal disorder	(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	در بیماری کلیوی GFR=30 کدام دارو احتیاج به کاهش دوز دارد؟	- 90
				سرترالین	(1)
				پاروکستین	(2) ✓
				سیتالوپرام	(3)
				فلوکستین	(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	در بیماری با اختلال عملکرد کلیوی برای تجویز کدام آنتی سایکوتیک احتیاط بیشتری می کنیم؟	- 91
				آربیپرازول	(1)
				الانزاپین	(2)
				ترانکوپین	(3)
				ریسپریدون	(4) ✓
معمولی	0/000	0/000	1/000	بیماری با افسردگی مقاوم به درمان کاندید ECT می باشد. کدام داروی بیمار می تواند ادامه یابد؟	- 92
				Lithium	(1)
				Amitriptyline	(2)
				Alprazolam	(3)
				Sertraline	(4) ✓

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	کدام ویژگی های شخصیتی به تطابق خوب با بیماری مدیکال کمک می کند؟	- 93
				Optimistic- flexibility	(1) ✓
				Passivity -reluctant to seek help	(2)
				Practical- rigidity	(3)
				Intolerant- optimistic	(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	شواهد برای تاثیر کدامیک در درمان بی اشتهاهی عصبی قویتر است؟	- 94
				ACT	(1)
				Manualized family -based treatment	(2) ✓
				Supportive psychotherapy	(3)
				Dynamic psychotherapy	(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدام یک از کرایتریاهای تشخیصی بی اشتهاهی عصبی براساس DSM5 نمی باشد؟	- 95
				BMI < 17	(1)
				اختلال در body image	(2)
				آمنوره	(3) ✓
				ترس از افزایش وزن	(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	برای تشخیص Functional Neurological Symptom Disorder کدام ویژگی زیر الزامی است؟	- 96
				اثبات غیر عمدی بودن علائم	(1)
				نیاز به وجود استرسور بارز	(2)
				کاهش یا تغییر در عملکرد حسی یا عملکرد نورولوژیک	(3) ✓
				هر سه مورد فوق	(4)

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم پاسخ
نوع سوال

معمولی	0/000	0/000	1/000	کدام مورد از ریسک فاکتورهای Factitious Disorder است؟	- 97
جنس مذکر- سابقه abuse- اختلال شخصیت آنتی سوشیال					(1)
جنسی مذکر- سابقه کار در کادر درمان- صفات شخصیت مازوخیستیک					(2)
جنس مونث- سابقه abuse - صفات شخصیت اسکیزوئید					(3)
جنس مونث- سابقه abuse - اختلال شخصیت مرزی					(4) ✓
معمولی	0/000	0/000	1/000	آقای ۳۴ ساله به دنبال ضربه به سر دچار رفتار مهار گسیخته، تحریک پذیری و تغییرات شخصیتی شده است. کدام قسمت مغز آسیب دیده است؟	- 98
ناحیه اوربیتو فرونتال					(1) ✓
ناحیه تمپورال					(2)
ناحیه اکسی پیتال					(3)
ناحیه پاریتال					(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	آقای ۴۳ ساله به دنبال stroke دچار حملات خنده وگریه غیرقابل کنترل شده است.کدام درمان برای کنترل عارضه فوق کمک کننده است؟	- 99
فنی توئین					(1)
کاربامازپین					(2)
الانزاپین					(3)
سرترالین					(4) ✓
معمولی	0/000	0/000	1/000	آقای جوان مبتلا به کولیت اولسرو به دنبال درمان با اینترفرون دچار INF-induced mania شده است. درمان انتخابی کدام است؟	- 100
کاهش دوز INF درصورت امکان + والپروات سدیم					(1)
بلافاصله INF قطع شود و هالوپریدول آغاز شود					(2)
ادامه دوز اینترفرون و شروع هالوپریدول					(3)
کاهش دوز اینترفرون در صورت امکان و شروع ریسپریدون					(4) ✓