



آزمون: آزمون فلوشیپ خرداد 1403 (سم شناسی بالینی)

مدت زمان: 120 دقیقه

آزمون مرتبط: سم شناسی

تعداد سوالات: 100

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

معمولی	0/000	0/000	1/000	1- بیماری بدنبال مصرف تریاک به اورژانس آورده شده است. در معاینات بالینی کدام یافته کمتر محتمل میباشد.	(1) ✓ (2) (3) (4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	2- بیماری با مسمومیت در بیمارستان بستری شده است. بیمار اسهال نیز دارد. کدام مسمومیت کمتر مطرح میباشد.	(1) ✓ (2) (3) (4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	3- در رادیوگرافی ساده شکم بیماری قرصهای رادیوپاک در معده مشاهده شده است. بنظر شما مسمومیت با چه قرصی مطرح بود است.	(1) (2) (3) ✓ (4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	4- بیماری اقدام به مصرف تعداد زیادی قرص نموده است. پزشک معالج پس از بررسی های لازمه جهت درمان وی ان استیل سیستین تجویز کرده است مسمومیت با چه دارویی مطرح بوده است.	(1) (2) ✓ (3) (4)

۹۰۹۹۰۷۵۳۰۷



dickofnak



irantahsil_moshaver

در صورتی که هر گونه پیشنهاد ، انتقاد یا شکایتی از نحوه عملکرد مجموعه دارید،
می توانید از طریق ایمیل info@irantahsil.org با ما در ارتباط باشید.

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم پاسخ
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	از کدام اپیوید بعنوان ضد سرفه نیز استفاده میشود	- 5
متادون				(1)	
بوپرنورفین				(2)	
پنتازوسین				(3)	
دکسترمتورفان				(4) ✓	
معمولی	0/000	0/000	1/000	بیمار با مصرف تعداد زیادی قرص ضد درد مراجعه نموده است. پزشک معالج با توجه به سطح سرمی بالای دارو دستور دیالیز اورژانس را صادر کرده است. داروی مورد ظن چه بوده است.	- 6
متادون				(1)	
آسپرین				(2) ✓	
ناپروکسن				(3)	
کدیین				(4)	
معمولی	0/000	0/000	1/000	در صورت مسمومیت با نفت برای بیمار کدامیک از اقدامات زیر معمولاً توصیه می شود	- 7
شستشوی معده				(1)	
تجویز شارکول				(2)	
تحریک به استفراغ				(3)	
کنترل علائم حیاتی				(4) ✓	
معمولی	0/000	0/000	1/000	طبيب به منظور خنثی کردن اثرات مسمومیت با دارویی، منیزיום تجویز کرده است. داروی فوق چه بوده ست.	- 8
آنتولول				(1)	
ایندرال				(2)	
سوتالول				(3) ✓	
نادولول				(4)	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	کدام داروی ضد فشار خون مکانیسمی متفاوت با بقیه دارد	- 9
وراپامیل				(1)	
دیلتازم				(2)	
نیفدیبین				(3)	
فوروزماید				(4) ✓	
معمولی	0/000	0/000	1/000	خانم مسن دچار نوعی بیماری قلبی با شکایت رویت هاله های زرد رنگ در اطراف چراغها به اورژانس مسمومین ارجاع داده شده است. بنظر شما مسمومیت با چه دارویی مطرح میباشد؟	- 10
دیگوکسین				(1) ✓	
تریامترن				(2)	
استازولامید				(3)	
لوزارتان				(4)	
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدام دارو با بقیه متفاوت است	- 11
آمی تریپتیلین				(1)	
نور تلیپتیلین				(2)	
سرتالین				(3) ✓	
ایمی پرامین				(4)	
معمولی	0/000	0/000	1/000	مرد جوانی با علائم مسمومیت با دارویی نامشخص مراجعه نموده است. پزشک تشخیص مسمومیت با ایمی پرامین گذاشته است. کدام نشانه تشخیص را زیر سوال می برد؟	- 12
تاکی کاردی				(1)	
اسهال				(2) ✓	
احتباس ادرار				(3)	
دهان خشک				(4)	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	بیماری بامصرف تعداد زیادی قرص لیتیوم کربنات ظرف ساعات اول به اورژانس مراجعه نموده است. کدام درمان هیچ کاربردی ندارد.	13 -
شارکول لاواژ تجویز پلی اتیلن گلیکول دیالیز					(1) ✓
					(2)
					(3)
					(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	در سندرم ویترواوال الک زمانی که بنزودیازپینها سدیشن کافی ایجاد نمیکند، کدام دارو قدم بعدی میباشد.	14 -
باکلوفن فنوباریتال مورفین گاباپنتین					(1)
					(2) ✓
					(3)
					(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	خوردن برخی انواع ماهی ها ممکن است باعث مسمومیت با کدام یک از فلزات زیر شود.	15 -
سرب کادمیوم قلع جیوه					(1)
					(2)
					(3)
					(4) ✓
معمولی	0/000	0/000	1/000	بدنبال مصرف الکلی نامشخص، بیمار با تاخیر و با شکایت اختلال بینایی بصورت منظره طوفان برف مراجعه نموده است. بنظر شما کدام الک عامل مسمومیت بوده است.	16 -
اتیلن گلیکول اتانول متانول بنزیل الک					(1)
					(2)
					(3) ✓
					(4)

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

معمولی	0/000	0/000	1/000	17 -	ناول های پوستی در پاشنه بیماری با کاهش هوشیاری با مسمومیت رویت شده است. کدام مسمومیت احتمالا عامل این ناولها میباشد.
				(1)	ماری جوانا
				(2) ✓	مونوکسیدکربن
				(3)	باکلوفن
				(4)	استامینوفن
معمولی	0/000	0/000	1/000	18 -	بیماری به دنبال مارگزیدگی با علایم هماتولوژیک مراجعه نموده است. به احتمال زیاد مار از چه نوعی بوده است.
				(1) ✓	افعی
				(2)	کبری
				(3)	مار دریایی
				(4)	مار آبی
معمولی	0/000	0/000	1/000	19 -	فشار خون در کدامیک از موارد زیر با سایرین متفاوت است
				(1) ✓	مسمومیت با سرب
				(2)	مسمومیت با پروپرانولول
				(3)	مسمومیت با دیلتیازم
				(4)	مسمومیت با لوزارتان
معمولی	0/000	0/000	1/000	20 -	فردی با علایم درد ژنرالیزه و تعریق بدنال گزش مراجعه نموده است. همراهان ادعا میکنندکه حشره فوق دارای علامت ساعت شنی قرمز در سطح شکمی خود بوده است. بنظر شما اسم حشره چه بوده است.
				(1)	رتیل
				(2)	عنکبوت منزوی
				(3) ✓	عنکبوت بیوه سیاه
				(4)	گادیم

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	بیمار آقای ۲۸ ساله با سابقه اختلال دو قطبی که تحت درمان با لیتیموم روزی ۲ عدد بوده است بدلیل تمایل به خودکشی اقدام به خوردن ۲۰ عدد قرص لیتیموم میکند . نوع مسمومیت بیمار	- 21
حاد				(1)	
مزمن				(2)	
حاد روی مزمن				(3) ✓	
مزمن روی حاد				(4)	
معمولی	0/000	0/000	1/000	بیماری کزاز در تشخیص افتراقی کدام مسمومیت قرار می گیرد؟	- 22
قارچ آمانیتا فالونیدس				(1)	
استریکنین				(2) ✓	
آهن				(3)	
استامینوفن				(4)	
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدامیک از موارد زیر اندیکاسیون دیالیز در مسمومیت با الکل چوب(متانول) می باشد؟	- 23
اختلال بینایی				(1)	
اغما				(2)	
تشنج				(3)	
همه موارد				(4) ✓	
معمولی	0/000	0/000	1/000	دیستونی حاد بغیر از مسمومیت با داروهای آنتی سایکوتیک در کدام مورد زیر نیز مشاهده می گردد؟	- 24
دیفن هیدرامین				(1)	
متوکلوپرامید				(2) ✓	
فنوباربیتال				(3)	
فلوکستین				(4)	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	درد شکمی، آنمی و یبوست در کدام مسمومیت مورد انتظار است؟	- 25
آرسنیک				(1)	
تالیوم				(2)	
سرب				(3) ✓	
جیوه				(4)	
معمولی	0/000	0/000	1/000	مهمترین ارگانی که در مسمومیت با استامینوفن آسیب می بیند کدام است؟	- 26
قلب				(1)	
ریه				(2)	
کلیه				(3)	
کبد				(4) ✓	
معمولی	0/000	0/000	1/000	در برخورد با فردی که با اویپوئید ها مسموم شده از کدامیک از دارو های زیر استفاده می کنید؟	- 27
نالوکسان				(1) ✓	
نالترکسان				(2)	
آتروپین				(3)	
آبی پروس				(4)	
معمولی	0/000	0/000	1/000	در درمان کدامیک از مسمومیت های زیر روش قلیایی کردن سرم مفید خواهد بود؟	- 28
مسمومیت با لیتیم				(1)	
مسمومیت با دیگوکسین				(2)	
مسمومیت با سالیسیلات				(3) ✓	
مسمومیت با اویپوم				(4)	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

29 -	ورزشکاران گاهی از ماده ای به نام کراتین استفاده می کنند؟ کدامیک از عوارض زیر ممکن است پس از مصرف کراتین دیده شود	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	کرامپ عضلانی				
(2)	اسهال				
(3)	دهیدراتاسیون				
(4) ✓	همه موارد				
30 -	پس از انجام تصویر برداری کدامیک از تظاهرات زیر با ماده ذکر شده مطابقت ندارد؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1) ✓	مصرف کورتیکواستروئید.....هیپردانسیته استخوانی				
(2)	تماس مزمن با سرب.....خطوط متافیزیال استخوانی				
(3)	مصرف فنی تونین.....لنفادنوپاتی ریوی				
(4)	فلونوروزیس.....استئو اسکلروز				
31 -	مسمومیت با کدام ویتامین ممکن است اختلال انعقادی ایجاد کند؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	ویتامین B				
(2)	ویتامین C				
(3)	ویتامین D				
(4) ✓	ویتامین E				
32 -	کدامیک از موارد زیر با مسمومیت با آهن مطابقت ندارد؟	1/000	0/000	0/000	معمولی
(1)	بروز علائم گوارشی				
(2)	شوک				
(3)	اختلال در آنزیم های کبدی				
(4) ✓	هیپرتانسیون				

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	مصرف کدامیک از داروهای زیر ممکن است بر عملکرد تیروئید اثر بگذارد؟	- 33
PTU				(1)	
پروپرانولول				(2)	
آمیودارون				(3)	
همه موارد				(4) ✓	
تراز	0/000	0/000	1/000	در مسمومیت با لووتیروکسین از کدامیک از موارد زیر استفاده نمی کنید؟	- 34
بتا بلوکر				(1)	
سرد کردن بیمار				(2)	
بنزودیازپین				(3)	
آسپرین				(4) ✓	
تراز	0/000	0/000	1/000	در مسمومیت با پروپرانولول کدامیک از موارد زیر محتمل تر است؟	- 35
هیپرتانسیون				(1)	
هیپر گلیسمی				(2)	
دیس ریتمی و برادی کاردی				(3) ✓	
اختلالات کبدی				(4)	
تراز	0/000	0/000	1/000	در کدامیک از مشاغل زیر احتمال مسمومیت با سرب کمتر است؟	- 36
در صنایع نمد سازی				(1) ✓	
در کارخانه جات ساخت باتری اتوموبیل				(2)	
در صنایع سرامیک سازی				(3)	
نقاشی ساختمان				(4)	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

تراز	0/000	0/000	1/000	منظور از کلاس IV در SCALE MALLAPATI چیست ؟	- 37
				(1) ✓ انتوباسیون بسیار مشکل است . (2) لوله انتوباسیون در مری قرار گرفته است . (3) سطح بیهوشی بالاست . (4) بیمار در حال بهوش آمدن است	
تراز	0/000	0/000	1/000	جهت ارزیابی صحیح بودن محل لوله تراشه پس از انتوباسیون بیمار کدامیک از موارد زیر مناسب است	- 38
				(1) اندازه گیری منواکسید کربن هوار باز دمی (2) اندازه گیری نیتروژن هوار باز دمی (3) اندازه گیری اکسیژن هوار باز دمی (4) ✓ اندازه گیری End tidal carbon dioxide	
تراز	0/000	0/000	1/000	کدامیک از موارد زیر بیشتر ممکن است تاکی کاردی ایجاد کند	- 39
				(1) ترکیبات ارگوت (2) داروهای بتا بلوکر (3) داروهای بلوک کننده کانال کلسیمی (4) ✓ داروهای سمپاتومیمتیک	
تراز	0/000	0/000	1/000	کدامیک از موارد زیر در مسمومیت با داروهای ضد افسردگی محتمل تر است	- 40
				(1) هیپرتانسیون (2) کوتاه شدن QRS در نوار قلب (3) برادیکاردی (4) ✓ تاکی کاردی	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

تراز	0/000	0/000	1/000	استفاده از شارکول در کدامیک از موارد زیر مفید است و کاربرد دارد؟	- 41
				(1) مسمومیت با وایتکس	
				(2) مسمومیت با اتانول	
				(3) مسمومیت با کپسول همتینیک	
				(4) مسمومیت با قرص فنوباریتال	✓
تراز	0/000	0/000	1/000	تعریق و لرزش معمولاً بعد از کدامیک از گزش های زیر واضح تر و شدیدتر دیده می شود؟	- 42
				(1) گزش مار	
				(2) گزش عقرب	
				(3) گزش نوعی عنکبوت	✓
				(4) گزش کنه	
تراز	0/000	0/000	1/000	مردمک ها در مسمومیت کدام مورد با بقیه متفاوت است؟	- 43
				(1) مسمومیت با اوپیوم	
				(2) مسمومیت با ارگانوفسفره	
				(3) مسمومیت با فنو بار بیتال	
				(4) مسمومیت با امفتامین	✓
تراز	0/000	0/000	1/000	در درمان کدام یک از مسمومیت های زیر از شارکول استفاده میکنیم	- 44
				(1) مسمومیت با روغن چرخ خیاطی	
				(2) مسمومیت با تیرک	
				(3) مسمومیت با وایتکس	
				(4) مسمومیت با کاپتوپریل	✓

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

تراز	0/000	0/000	1/000	پاد زهر مسمومیت با منواکسید کربن کدامیک از موارد زیر است ؟	- 45
				(1) ان استیل سیستئین	
				(2) مانیتول	
				(3) بیکربنات	
				(4) اکسیژن	✓
تراز	0/000	0/000	1/000	در مورد اثر مصرف امفتامینها کدام جمله زیر صحیح است	- 46
				(1) فشار خون اغلب افزایش می یابد	✓
				(2) ضربان اغلب کاهش می یابد	
				(3) مردمک ها تنگ می شود	
				(4) فرد اغلب دچار خواب الودگی میشود	
معمولی	0/000	0/000	1/000	در درمان علائم ناشی از مسمومیت با امفتامین ها کدام داروی زیر بکار می رود	- 47
				(1) بنزودیازپین	✓
				(2) پروپرانولول	
				(3) اتروپین	
				(4) فیزوستیگمین	
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدامیک از موارد زیر از اثرات مصرف اوپیوئید هاست	- 48
				(1) بیبوست	✓
				(2) کاهش اشتها	
				(3) افزایش انقباض عروق محیطی	
				(4) تعریق	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم پاسخ
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	در مسمومیت با متانول کدامیک از داروهای زیر استفاده می شود	- 49
					(1)
اسید فولیک					
					(2)
اتانول					
					(3)
بی کربنات					
					(4) ✓
همه موارد					
معمولی	0/000	0/000	1/000	آقای جوانی پس از مصرف مقداری اتانول با اختلال هوشیاری خفیف در واحد اورژانس بستری است. در بررسی چه مواردی مهم تر است؟	- 50
					(1)
اندازه گیری قند خون					
					(2)
بررسی آنالیز گازهای خونی					
					(3)
بررسی دمای بدن					
					(4) ✓
همه موارد					
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدامیک از موارد زیر در مورد مسمومیت با سرب صحیح نیست؟	- 51
					(1) ✓
معمولا افت فشار خون دارند					
					(2)
معمولا آنمی دارند					
					(3)
معمولا درد شکمی دارند					
					(4)
معمولا یبوست دارند					
معمولی	0/000	0/000	1/000	در توکسیدروم کولینرژیک کدام یافته کمتر دیده می شود	- 52
					(1) ✓
خشکی دهان					
					(2)
اشک ریزش					
					(3)
اسهال					
					(4)
رال ریه					

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	در کدام مورد از مسمومیت های زیر استفاده از شارکول مفید است ؟	- 53
				(1) مسمومیت با قرص فروس سولفات	
				(2) مسمومیت با قرص لیتمیم	
				(3) مسمومیت با استامینوفن	✓
				(4) (مسمومیت با تینر) هیدروکربن	
معمولی	0/000	0/000	1/000	در برخورد با موارد مارگزیدگی کدامیک از موارد زیر توصیه می شود ؟	- 54
				(1) بی حرکت کردن اندام مبتلا	
				(2) تجویز آنتی ونوم	
				(3) تجویز ضد درد	
				(4) همه موارد	✓
معمولی	0/000	0/000	1/000	پادزهر مسمومیت با منواکسید کربن کدامیک از موارد زیر است ؟	- 55
				(1) ان استیل سیستتین	
				(2) نرمال سالین	
				(3) بیکربنات	
				(4) اکسیژن	✓
معمولی	0/000	0/000	1/000	استفاده از شارکول در کدامیک از موارد زیر مفید است و کاربرد دارد؟	- 56
				(1) مسمومیت با وایتکس	
				(2) مسمومیت با بنزین	
				(3) مسمومیت با کپسول همتینیک	
				(4) مسمومیت با قرص فنوباریتال	✓

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	تقریق و لرزش معمولاً بعد از کدامیک از گزش های زیر واضح تر و شدیدتر دیده می شود؟	- 57
				(1) گزش مار	
				(2) گزش عقرب	
				(3) ✓ گزش نوعی عنکبوت	
				(4) گزش زنبور	
معمولی	0/000	0/000	1/000	در بررسی مردمک ها کدام مورد با بقیه متفاوت است ؟	- 58
				(1) مسمومیت با داروی ایمی پرامین	
				(2) ✓ مسمومیت با فنوباریتال	
				(3) مسمومیت با آمفتامین ها	
				(4) مسمومیت با داروی آنتی کولیرژیک	
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدامیک از موارد زیر جزو اثرات اویپوئید ها است ؟	- 59
				(1) افزایش ضربان	
				(2) افزایش تعداد تنفس	
				(3) افزایش هوشیاری	
				(4) ✓ اثر ضد سرفه	
معمولی	0/000	0/000	1/000	در درمان مسمومیت با سموم ارگانوفسفره کدام مورد بیشتر کاربرد دارد؟	- 60
				(1) دیالیز	
				(2) ✓ آتروپین	
				(3) کلونیدین	
				(4) دوز های چند گانه شارکول	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	در مصرف داروی متادون کدام یک از اختلالات الکتروکاردیوگرام شایع تر است	- 61
				طولانی شدن qrs	(1)
				طولانی شدن PR	(2)
				طولانی شدن QT	(3) ✓
				تغییرات ST	(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	در کدام یک از مسمومیت های زیر اندازه گیری سطح خونی دارو یا ماده اهمیت بیشتری دارد	- 62
				مسمومیت با استامینوفن	(1) ✓
				مسمومیت با ایمنی پرامین	(2)
				مسمومیت با پاپرتروئید	(3)
				مسمومیت با اگزازپام	(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	فردی با احتمال نوعی مسمومیت وسیالوره در اورژانس بستری شده است . به نظر شما کدامیک برای بیمار کمتر م طرح است	- 63
				HCL) مسمومیت با محلول تیرک	(1)
				مسمومیت با سموم ارگانوفسفره	(2)
				مسمومیت با پودر پرمنگات	(3)
				مسمومیت با قرص امی تریپتیلین	(4) ✓
تراز	0/000	0/000	1/000	در بیماری که با مقداری قرص پروپرانولول مسموم شده است کدام یک از وقایع زیر محتمل تر است ؟	- 64
				هیپوگلیسمی	(1) ✓
				تاکی کاردی	(2)
				افزایش فشار خون	(3)
				کوتاه شدن فاصله PR	(4)

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

تراز	0/000	0/000	1/000	در بیماری که با مقداری نفت مسموم شده است. کدامیک از اقدامات زیر را انجام میدهید؟	- 65
				(1) تجویز شارکول	
				(2) تحریک با استفراغ	
				(3) شستشوی معده	
				(4) تجویز پنتازول	✓
تراز	0/000	0/000	1/000	در کدامیک از مسمومیت های زیر تشنج جزو تظاهرات بارز است ؟	- 66
				(1) مسمومیت با سموم سوسک پیرتروئیدها	
				(2) مسمومیت با سموم ارگانوفسفره	
				(3) مسمومیت با جوته کش های وارفارینی	
				(4) مسمومیت با سموم ارگانوکولره	✓
تراز	0/000	0/000	1/000	علائم عصبی بیشتر در کدام نوع گزش دیده می شود ؟	- 67
				(1) گزش افعی	
				(2) گزش سوسک تاول زا	
				(3) گزش مار کبری	✓
				(4) گزش زنبور	
تراز	0/000	0/000	1/000	در مسمومیت با سموم ارگانوفسفره مردمک ها معمولا شبیه کدام مورد زیر است	- 68
				(1) مسمومیت با آفتامین	
				(2) مسمومیت با آمی تریپتیلین	
				(3) مسمومیت با آتروپین	
				(4) مسمومیت با اوپیوم	✓

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

تراز	0/000	0/000	1/000	در برخورد با موارد مارگزیدگی کدامیک از موارد زیر توصیه می شود؟	- 69
تجویز آنتی ونوم				(1)	
تجویز ضد درد				(2)	
کنترل CBC				(3)	
همه موارد				(4) ✓	
تراز	0/000	0/000	1/000	در درمان مسمومیت با منواکسید کربن کدام مورد به کار می رود؟	- 70
نالوکسان				(1)	
دفروکسامین				(2)	
دیمرکاپرول BAL				(3)	
اکسیژن				(4) ✓	
معمولی	0/000	0/000	1/000	در مورد بیماری که مقدار زیادی اتانول مصرف کرده است کدامیک از درمان های زیر را انتخاب می کنید	- 71
تجویز ویتامین B1				(1) ✓	
تجویز داروهای ضد فشار خون				(2)	
تجویز انسولین				(3)	
تجویز دیورتیک				(4)	
معمولی	0/000	0/000	1/000	بدنبال مصرف تعداد زیادی کلرپرومازین انتظار بروز کدام یافته بیشتر محتمل میباشد.	- 72
تاکی کاردی				(1) ✓	
هایپرتانسیون				(2)	
بی اختیاری ادراری				(3)	
خشکی دهان				(4)	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	کدام یک از نظر ساختار شیمیایی با بقیه متفاوت می باشد.	- 73
				1 ✓ کلرودیاز پوکساید 2 آمی تریپتیلین 3 ایمی پرامین 4 کلومپیرامین	
معمولی	0/000	0/000	1/000	بیماری ادعای مصرف ۲۰ عدد نورتریپتیلین طی ۴ ساعت قبل میکند. کدام یافته در معاینه بالینی وی خلاف اظهار نظر وی تلقی میگردد.	- 74
				1 ✓ میدریاز 2 تاکی کاردی 3 هایپر تانسیون 4 فلشینگ صورت	
معمولی	0/000	0/000	1/000	خانم ۳۰ ساله بدنبال مصرف ۳۰ عدد لیتیم طی ۵ ساعت قبل مراجعه کرده است . کدام یافته زیر ادعای نامبرده را زیر سوال میبرد.	- 75
				1 تهوع 2 ✓ یبوست 3 سرگیجه 4 هایپوتانسیون	
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدام یافته در مسمومیت با سرب دیده نمیشود.	- 76
				1 دل درد 2 هایپر تانسیون 3 ✓ اسهال 4 آنمی	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	در ORDER بیماری فولات با دوز بالا تجویز شده است. بنظر شما مسمومیت با چه ماده ای مطرح بوده است.	- 77
دیازینون				(1)	
لیندان				(2)	
کاربامازپین				(3)	
متانول				(4) ✓	
معمولی	0/000	0/000	1/000	بدنبال مصرف سم ارگانوفسفره بیماری مراجعه میکند. در ابتدا کدام یافته را معمولاً انتظار نداریم.	- 78
خشکی دهان				(1) ✓	
افت فشار خون				(2)	
میوز				(3)	
برادی کاردی				(4)	
معمولی	0/000	0/000	1/000	در سی تی اسکن بیماری ضایعات هیپودانس در هسته پوتامن رویت شده است. مسمومیت با کدام ماده بیشتر مطرح میباشد.	- 79
مونوکسید کربن				(1) ✓	
مفنامیک اسید				(2)	
متی مازول				(3)	
استامینوفن				(4)	
معمولی	0/000	0/000	1/000	آقای ۴۰ ساله با سابقه مصرف تزریقی هروئین بستری شده است. پزشک تشخیص اندوکاردیت عفونی را برای وی مطرح نموده است. کدام یک از علائم زیر با احتمال بیش از ۵۰ درصد در این بیمار تظاهر می کند؟	- 80
درد پشت				(1)	
کلاینگ				(2)	
سوفل قلبی				(3) ✓	
علائم عصبی				(4)	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	کدامیک از موارد زیر می تواند بعنوان عارضه پس از اسهال عفونی رخ دهد؟	- 81
				(1) اسهال مزمن (بیش از ۴ هفته)	
				(2) HUS	
				(3) IBS	
				(4) همه موارد	✓
معمولی	0/000	0/000	1/000	آقای ۵۲ ساله با شکایت خستگی مزمن مراجعه نموده است. در معاینه HR: 42/min می باشد. کدام یک از موارد زیر نمی تواند به عنوان علت برادیکاردی بیمار مطرح باشد؟	- 82
				(1) مصرف سوتالول	
				(2) مصرف کلونیدین	
				(3) مصرف شیشه یا اقماتمین	✓
				(4) هایپوتیروئیدی	
معمولی	0/000	0/000	1/000	آقای ۷۵ ساله مورد نارسایی قلب چهار قلم دارو مصرف می کند. بیمار اظهار میدارد با یکی از این داروها دچار سردرد و ورم پاها شده است. بنظر شما این دارو کدام است؟	- 83
				(1) دیلتیازیم	
				(2) آملودیپین	✓
				(3) تریامترن اچ	
				(4) وراپامیل	
معمولی	0/000	0/000	1/000	آقای ۲۵ ساله با شکایت از سرفه و خلط چرکی از مدتی قبل بستری شده در CXR برونشکتازی فوکال دیده می شود. سابقه بیماری خاصی را ذکر نمی کند. کدام مورد بیشتر به عنوان علت این مشکل مطرح می باشد؟	- 84
				(1) آسپیریشن جسم خارجی	✓
				(2) فیبروز سیستیک	
				(3) آرتریت روماتوئید	
				(4) AIDS	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	خانم ۳۶ ساله با شکم درد و علائم انسداد حاد روده بستری شده است. کدام مورد می تواند بعنوان علت این وضعیت مطرح باشد؟	- 85
				(1) چسبندگی ناشی از عمل جراحی قبلی شکمی	
				(2) هرنی ها	
				(3) نئوپلاسم مانند کانسر تخمدان	
				(4) همه موارد	✓
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدامیک از موارد زیر جزو درمان های توصیه شده جهت هیپرکالمی نمی باشد؟	- 86
				(1) تجویز داروهای بتا بلاکر	✓
				(2) قطع داروهای ACE inhibitor و NSAIDs	
				(3) هیپر انسولینمی یوگلا یسمی	
				(4) تجویز رزین پلی استیرن سولفونات	
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدام داروی زیر از مشتقات آمفتامین می باشد و در درمان بیماری بیش فعالی ADHD بکار می رود	- 87
				(1) رزپرین	
				(2) متیل فنیدت	✓
				(3) اکسی بوتینین	
				(4) تولترودین	
تراز	0/000	0/000	1/000	داروی انتخابی در شوک آنافیلاکسی کدام است	- 88
				(1) اپی نفرین	✓
				(2) دوپامین	
				(3) دوبوتامین	
				(4) ایزوپرنترول	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

تراز	0/000	0/000	1/000	کدام خانواده دارویی بر نکودیلاتور می باشند؟	- 89
				(1) بتا آنتاگونیست	
				(2) ✓ بتا ۲ آگونیست	
				(3) آلفا آگونیست	
				(4) آلفا آنتاگونیست	
تراز	0/000	0/000	1/000	کاربرد درمانی یک داروی آنتی کولینرژیک در درمان همه موارد زیر می تواند باشد <u>بجز</u> :	- 90
				(1) آسم	
				(2) معاینه ته چشم	
				(3) ✓ BPH	
				(4) برادیکاردی	
تراز	0/000	0/000	1/000	تمام دارو های زیر سبب کاهش ضربان قلب می گردند <u>بجز</u> :	- 91
				(1) آنتولول	
				(2) ✓ سالبوتامول	
				(3) کارودیلول	
				(4) متوپرولول	
تراز	0/000	0/000	1/000	مصرف کدام داروی زیر در دوره بارداری در گروه X قرار دارد	- 92
				(1) آموکسی سیلین	
				(2) ✓ تالیدوماید	
				(3) سفالکسین	
				(4) پروپرانولول	

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

تراز	0/000	0/000	1/000	برادی کاردی و میوزیس از اثرات کدام داروی کاهنده فشار خون می تواند باشد؟	- 93
				مینوکسیدیل	(1)
				دیلتازم	(2)
				کلونیدین	(3) ✓
				آنتولول	(4)
تراز	0/000	0/000	1/000	کدام ایزو آنزیم زیر سهم بیشتری در متابولیسم داروها در کبد دارد؟	- 94
				CYP3A4	(1) ✓
				CYP2D6	(2)
				CYP1A2	(3)
				CYP2C19	(4)
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدام اثر از اثرات داروی هیوسین نمی باشد؟	- 95
				تاکیکاردی	(1)
				خشکی دهان	(2)
				میدریازیس	(3)
				برنکواسپاسم	(4) ✓
معمولی	0/000	0/000	1/000	مصرف کدام داروی زیر در بیماران مبتلا به آسم ممنوع است	- 96
				ایپراتروپیوم بروماید	(1)
				پروپرانولول	(2) ✓
				پرازوسین	(3)
				اپی نفرین	(4)

نمره پاسخ صحیح
نمره پاسخ غلط
نمره عدم سخگو
نوع سوال

تعداد سوالات در هر صفحه: 100

معمولی	0/000	0/000	1/000	در مسمومیت با داروی آتروپین کدام عارضه زیر دیده می شود؟	- 97
اسهال				(1)	
برنکواسپاسم				(2)	
میوزیس				(3)	
توهم				(4) ✓	
معمولی	0/000	0/000	1/000	غلظت دارویی ۴۰ نانوگرم در دسی لیتر است. نیمه دارو ۲ ساعت می باشد. پس از چند ساعت غلظت دارو در خون به ۱۰ نانوگرم در دسی لیتر خواهد رسید	- 98
۴				(1) ✓	
۶				(2)	
۸				(3)	
۱۰				(4)	
معمولی	0/000	0/000	1/000	کدام داروی زیر پرنکودیلاتور می باشد	- 99
فنیل افرین				(1)	
سالبوتامول				(2) ✓	
آنتولول				(3)	
پیلوکارپین				(4)	
معمولی	0/000	0/000	1/000	فاصله "حداقل غلظت موثر" و "حداقل غلظت سمی" یک دارو را چه می نامند؟	- 100
پنجره درمانی				(1) ✓	
فراهمی زیستی				(2)	
حجم توزیع				(3)	
کلیرنس				(4)	