

در کولمب گوانی: عدم درج مشخصات و امضا در بخش حالت جدول اول، به سطر اول، عدم حضور بیمار در بخش جدول اول است.
با شماره داوطلبان
حسب این مورد و با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارته ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سوالات نوبت
و کارکنان درج شده در روی دفترچه سوالات و پاسخ پاسخنامه را باید می‌نمایند.

لطفاً

مادران و نوزادان در کولمب

- ۱۰۶- در هنگام پذیرش نوزاد نرم حاصل زایمان سوزن ۳ و وزن 3300 گرم، آپگار دقیقه اول ۸ و دقیقه پنجم ۹
در بخش نوزادان، اولین اقدام پرستار کدام است؟
۱- شستن گرمای خنک
۲- برقراری دمای بدن
۳- تعذیه مطلوب با شیر مادر
۴- پس از اطمینان قطعی از برنامه مراقبت از مادر، کدام اقدام صحیح نیست؟
۱- بعد از اولین احداث مراقب می‌تواند خوابی باشد و مایعات مصرف کند
۲- برای تسکین پس‌زدهای پس از زایمان، از کینول مقدماتیکسید استفاده می‌شود.
۳- به محض اینکه مادر قادر به راه رفتن باشد، می‌تواند از ستر خارج شده و حرکت کند.
۴- در صورت آبریزش، ناشی حین لایس و سیکسوی پرینه، هر روز ۳ بار انجام شود.
۱۰۸- در معاینه و ارزیابی نوزاد نا من هنگام تولد ۳۷ هفته، کدام مورد غیرطبیعی محسوب می‌شود؟
۱- فشارخون سیستولیک 70mmHg و 36.5C
۲- رنکس مورو مثبت و فونتال فمیس ۲ سانتی‌متر
۳- HR = 140/min و RR = 14/min
۴- نور سر ۳۶ میلی‌متر و قد ۵۱ سانتی‌متر
۱۰۹- در بخش نوزادان، کدام مورد زیر، نیاز به پیگیری تخصصی دارد؟
۱- ختم دفع مدفوع پس از گذشت ۲۸ ساعت از تولد
۲- مشاهده ترشحات صورتی روی پوشک نوزاد دحیر
۳- عدم دفع ادرار در ۱۲ ساعت اول پس از تولد
۴- وجود موه‌های اتوگم در ناحیه کف
۱۱۰- درخصوص نوزادان بستری در بخش، کدام مورد صحیح نیست؟
۱- مایه‌دوس بیش از ۱۵mg/dl در نوزاد نرم ۳ روزه، نیاز به بستری در NICU دارد.
۲- زردی قریب‌بزرگه از روز ۴ پس از تولد شروع و تا روز ۱۰-۷ پایدار می‌شود.
۳- در نوزاد ۳۴ هفته، زردی تا سطح بیلیروبین 15mg/dl غیرپاتولوژیک است.
۴- زردی نوزاد، در هر دو اول پس از تولد، ناشی از ستر مادر است.
۱۱۱- کدام گروه‌دارویی از داروهای زیر، برای کاهش فشارخون در مادران باردار با پره‌اکلامپسی در نوبت اورژانس
ضروری است؟
۱- نیتروگلیسرین - لاریکس - سولفانامیدیزیم
۲- هیدرالازین - سولفانامیدیزیم - دیازپام
۳- هپارین - هیدرالازین - آدالات
۴- کلیدی‌ترین نکته که پرستاران باید در ارتباط با کودکان، به آن توجه داشته باشند چیست؟
۱- وضعیت روانی عاطفی کودک و خانواده
۲- نوع بیماری و تأثیرات آن
۳- اولویت‌های خانواده و بیماری کودک



۱۱۳- بهترین دستورالعملی غیر دارویی برای کاهش درد و اسپاسم کولیک در پروستاتهای درشتال است:

- ۱) حمایت روانی کودک
- ۲) پوشش به کودک
- ۳) تحریک دگر
- ۴) تحریک شکم

۱۱۴- منظور از فرمان غیر دارویی در اسهال کودکان کدام است؟

- ۱) سواپر آب دهانی
- ۲) سواپر آب دهانی
- ۳) کنترل آب دهانی
- ۴) سواپر آب دهانی

۱۱۵- پرونده اداری بیمار از جمله (MIL, Kig, N) شامل موارد زیر است. کدام یک از موارد زیر است؟

- ۱) ۳
- ۲) ۴
- ۳) ۲
- ۴) ۱

۱۱۶- منظور از اختلالات استخوانی جهت کنترل عفونت در بیمارستان ها چیست؟

- ۱) اختلالات استخوانی در به خورد با خون و مایعات بدن
- ۲) اختلالات استخوانی در کنترل عفونت کولیک هواری
- ۳) اختلالات در شش های منقبض و غیر منقبض
- ۴) اختلالات عفونی در بیمارستان ها

روان پرستاری

۱۱۷- مددجو به جای گفته «پاییزی» از «خویشی» به این حالت چه نام دارد؟

- ۱) واژسازی
- ۲) واژسازی
- ۳) واژسازی
- ۴) واژسازی

۱۱۸- پرستار دارویی ترکیبی پروستاتین و هالوپریدول را به مددجو توزیع نموده و مددجو دچار

تغییری حواسی شده است. عضو این حالت چیست؟

- ۱) قلب از تریپل باید برای اختلال پروستاتین و پروستاتین با پروستاتین
- ۲) قلب از تریپل باید برای اختلال پروستاتین و پروستاتین با پروستاتین
- ۳) قلب از تریپل باید برای اختلال پروستاتین و پروستاتین با پروستاتین
- ۴) قلب از تریپل باید برای اختلال پروستاتین و پروستاتین با پروستاتین

۱۱۹- مددجو معتقد است که اطلاعات موجود در نقش همراه او به سرعت رفته است او به کدام مورد دچار

مشکل شده است؟

- ۱) فرگ
- ۲) فرگ
- ۳) فرگ
- ۴) فرگ

۱۲۰- در کدام مورد زیر مددجو جهت مدیریت استرس خود از تکنیکهای استفاده کرده است؟

- ۱) پوشش موقع صحبت کردن با من. خیلی شد حرف می زنم
- ۲) پرستار فکر می کند که من با همکارانم مشکل دارم
- ۳) پرستار زمان دارو دادن خیلی عقب افتاد
- ۴) پرستار پوشش مرا زودتر ترخیص کند

۱۲۱- مددجوی مبتلا به اختلال دوقطبی من بشماره که با او کمترین تماس در ارتباط است کدام مورد خواهد بود؟

- ۱) روان گویان با شماره روان گویان
- ۲) روان گویان با شماره روان گویان
- ۳) روان گویان با شماره روان گویان
- ۴) روان گویان با شماره روان گویان

۱۲۲- در داروهای زیر کدام مورد عوارض جانبی کمتری دارد؟

- ۱) هالوپریدول (Haloperidol)
- ۲) هالوپریدول (Haloperidol)
- ۳) هالوپریدول (Haloperidol)
- ۴) هالوپریدول (Haloperidol)

۱۲۳- کاربرد آمپول در الکتروشوک چیست؟

- ۱) کنترل تحریکات مغزی
- ۲) کنترل تحریکات مغزی
- ۳) کنترل تحریکات مغزی
- ۴) کنترل تحریکات مغزی

۱۲۴- کنترل تحریکات مغزی از اختلالات کلسانی

۱۲۴- مدارجو دارای اختلال اسکیزوفرنی است. نامی وی غیر سابقه ابتلا به این اختلال را دارد. کدام مورد زیر، در مورد اختلال روانی وی مطرح است؟

- ۱) هیپوتیروئیدیسم
- ۲) ایدز
- ۳) اختلال اضطراب
- ۴) بیکسیتیک‌های فراساطعی
- ۵) بیکسیتیک‌های فراساطعی
- ۶) بیکسیتیک‌های فراساطعی
- ۷) بیکسیتیک‌های فراساطعی
- ۸) بیکسیتیک‌های فراساطعی

۱۲۵- از تکنیک‌های فراساطعی زیر، کدام مورد می‌تواند اختصاص غیر درمانی داشته باشد؟

- ۱) بیکسیتیک‌های فراساطعی
- ۲) بیکسیتیک‌های فراساطعی
- ۳) بیکسیتیک‌های فراساطعی
- ۴) بیکسیتیک‌های فراساطعی
- ۵) بیکسیتیک‌های فراساطعی
- ۶) بیکسیتیک‌های فراساطعی
- ۷) بیکسیتیک‌های فراساطعی
- ۸) بیکسیتیک‌های فراساطعی

۱۲۶- مدارجو اظهار می‌دارد که جهت درمان به بیمارستان مراجعه کرده، اما پدرش نیز در بروز بیماری وی سهم داشت. در وضعیت روانی وی، کدام مورد غیرطبیعی ارزیابی می‌شود؟

- ۱) بی‌سختی
- ۲) بی‌سختی
- ۳) بی‌سختی
- ۴) بی‌سختی
- ۵) بی‌سختی
- ۶) بی‌سختی
- ۷) بی‌سختی
- ۸) بی‌سختی

بهداشت جامعه

۱۲۸- از خصوصیات همه گیری تک‌منبعی مداوم در بیماری‌های واگیردار، کدام مورد صحیح است؟

- ۱) تعداد موارد سریعاً افزایش و کاهش می‌یابد
- ۲) از چندین محل و منبع، به‌طور همزمان شروع می‌شود
- ۳) طول مدت همه‌گیری به اندازه یک دوره کمون بیماری است
- ۴) شروع تدریجی دارد و موارد به‌طور غیرمعمول بروز می‌کنند
- ۵) زمانی که در صورت تکرار در فرد و سوابق یکسان، سنج یکپارچگی و ناسی داشته باشد، نشان‌دهنده
- ۶) کدام‌یک از مشخصات فوق‌الذکر است؟
- ۷) بزرگی
- ۸) تکرار

۱۲۹- جستجوی بیماری در مرحله قبل از بروز بیماری، مطابق با کدام سطوح پیشگیری است؟

- ۱) سطوح اول
- ۲) سطوح دوم
- ۳) سطوح سوم
- ۴) سطوح اول
- ۵) سطوح دوم
- ۶) سطوح سوم
- ۷) سطوح اول
- ۸) سطوح دوم

۱۳۰- واکنش‌های بدو تولد طبق برنامه واکنش‌ساز ایران، کدام‌اند؟

- ۱) به‌دتر - هیپاتیت - MMIR
- ۲) به‌دتر - هیپاتیت - MMIR
- ۳) به‌دتر - هیپاتیت - MMIR
- ۴) به‌دتر - هیپاتیت - MMIR
- ۵) به‌دتر - هیپاتیت - MMIR
- ۶) به‌دتر - هیپاتیت - MMIR
- ۷) به‌دتر - هیپاتیت - MMIR
- ۸) به‌دتر - هیپاتیت - MMIR

۱۳۱- ماهیت کدام‌یک از واکنش‌ها، آنتی‌ژن سطحی و پروتئین است؟

- ۱) فلوئید
- ۲) دیتری کرز
- ۳) به‌دتر
- ۴) به‌دتر
- ۵) به‌دتر
- ۶) به‌دتر
- ۷) به‌دتر
- ۸) به‌دتر

۱۳۲- اولین ساری کودک ۹ ماهه که در موعد مقرر مراجعه نکرد، در اولین مراجعه، شامل کدام واکنش‌هاست؟

- ۱) به‌دتر - به‌دتر - به‌دتر
- ۲) به‌دتر - به‌دتر - به‌دتر
- ۳) به‌دتر - به‌دتر - به‌دتر
- ۴) به‌دتر - به‌دتر - به‌دتر
- ۵) به‌دتر - به‌دتر - به‌دتر
- ۶) به‌دتر - به‌دتر - به‌دتر
- ۷) به‌دتر - به‌دتر - به‌دتر
- ۸) به‌دتر - به‌دتر - به‌دتر

۱۳۳- اینکه چرا بعضی افراد از خدمات بهداشتی استفاده می‌کنند و گروه دیگر این کار را نمی‌کنند، با کدام الگوی زیر، قابل توجه است؟

- ۱) تغییر رفتار
- ۲) برنامه‌ریزی
- ۳) تغییر رفتار
- ۴) برنامه‌ریزی
- ۵) تغییر رفتار
- ۶) برنامه‌ریزی
- ۷) تغییر رفتار
- ۸) برنامه‌ریزی

۱۳۵- در کدام قسمت از گاز با جابجاده، پرستار بهداشت منوجه اعلام بر مالتا میسر در این باره می شود؟

- ۱) بزرگ ریه ری
- ۲) تنفسی پرستار
- ۳) سوختن جرمی کود که کدام مورد است؟
- ۴) موثر بودن واکسن از نظر رگانی

۱۳۶- سوختن جرمی کود که کدام مورد است؟

- ۱) موثر بودن واکسن از نظر رگانی
- ۲) سوختن جرمی کود که کدام مورد است؟
- ۳) سوختن جرمی کود که کدام مورد است؟
- ۴) سوختن جرمی کود که کدام مورد است؟

۱۳۷- کدام یک از گازهای موجود در هوا، از مهم ترین آلوده کننده های هوا به شمار می آید؟

- ۱) مونوکسید کربن
- ۲) دی اکسید کربن
- ۳) نیتروژن
- ۴) اکسیژن

۱۳۸- پیشگیری سطح ۳، بر کدام دسته از فعالیت ها تأکید دارد؟

- ۱) پیشگیری سطح ۳
- ۲) جلوگیری از انتقال بیماری
- ۳) جلوگیری از انتقال بیماری
- ۴) جلوگیری از انتقال بیماری

بخش های ویژه

۱۳۹- برای بیمار با گاز خون شریانی $PaCO_2 = 22$ ، $HCO_3^- = 22$ و $pH = 7.58$ ، معیار مناسب کدام است؟

- ۱) الکترولیت متابولیک با جریان کامل
- ۲) الکترولیت متابولیک با جریان کامل
- ۳) الکترولیت متابولیک با جریان کامل
- ۴) الکترولیت متابولیک با جریان کامل

۱۴۰- در درمان اختلالات اسید و باز، به طور کلی، بهترین اقدام کدام است؟

- ۱) کنترل مجدد ABG
- ۲) حفظ حداکثر اکسیژناسیون
- ۳) تغییرات کلیه ای
- ۴) تغییرات کلیه ای

۱۴۱- در معیاش گمائی گلاسکو، به بیماری که با تحریک دردناک، چشم هایش را باز می کند، در یکم از اصوات تاسیروپ استفاده می کند و در قسمت حرکات با تحریک دردناک، محل درد را نشان می دهد چه نمره ای داده می شود؟

- ۱) ۱
- ۲) ۲
- ۳) ۳
- ۴) ۴

۱۴۲- در انجام ساکشن بیمار، کدام مورد صحیح تر است؟

- ۱) کسر ساکشن برای تخلیه بهتر ترشحات، تا بیشتر جدا ممکن دارد ترشحات شود
- ۲) در صورت غلبه بودن ترشحات از آب مقطر استفاده می کند
- ۳) ساکشن باز، باعث کاهش عفونت های تنفسی می شود
- ۴) مدت زمان ساکشن، حداکثر ۱۰ تا ۱۵ ثانیه باشد

۱۴۳- پرستار در هنگام انفوزیون الکترولیت، باید در کدام مورد، احتیاط بیشتری بعمل آورد؟

- ۱) سدیم
- ۲) پتاسیم
- ۳) کلسیم
- ۴) منیزیم

۱۴۴- تا چند ساعت قبل از اعمال جراحی، می توان به بیمار آن مایعات داد؟

- ۱) ۸
- ۲) ۴
- ۳) ۲
- ۴) ۱

۱۴۵- در صورت خروج ناخواسته لوله تراشه توسط بیمار، کدام اقدام صحیح است؟

- ۱) حمایت با اکسیژن، پوشش مناسب و مانیتورینگ کامل
- ۲) آرام سازی بیمار با دارو و لوله گذاری مجدد
- ۳) کنترل گازهای خون شریانی
- ۴) لوله گذاری مجدد

۱۴۶- در صورت خروج ناخواسته لوله تراشه توسط بیمار، کدام اقدام صحیح است؟

- ۱) حمایت با اکسیژن، پوشش مناسب و مانیتورینگ کامل
- ۲) آرام سازی بیمار با دارو و لوله گذاری مجدد
- ۳) کنترل گازهای خون شریانی
- ۴) لوله گذاری مجدد

۱۴۷- در صورت خروج ناخواسته لوله تراشه توسط بیمار، کدام اقدام صحیح است؟

- ۱) حمایت با اکسیژن، پوشش مناسب و مانیتورینگ کامل
- ۲) آرام سازی بیمار با دارو و لوله گذاری مجدد
- ۳) کنترل گازهای خون شریانی
- ۴) لوله گذاری مجدد

۱۴۸- در صورت خروج ناخواسته لوله تراشه توسط بیمار، کدام اقدام صحیح است؟

- ۱) حمایت با اکسیژن، پوشش مناسب و مانیتورینگ کامل
- ۲) آرام سازی بیمار با دارو و لوله گذاری مجدد
- ۳) کنترل گازهای خون شریانی
- ۴) لوله گذاری مجدد

۱۴۹- در صورت خروج ناخواسته لوله تراشه توسط بیمار، کدام اقدام صحیح است؟

- ۱) حمایت با اکسیژن، پوشش مناسب و مانیتورینگ کامل
- ۲) آرام سازی بیمار با دارو و لوله گذاری مجدد
- ۳) کنترل گازهای خون شریانی
- ۴) لوله گذاری مجدد

۱۵۰- در صورت خروج ناخواسته لوله تراشه توسط بیمار، کدام اقدام صحیح است؟

- ۱) حمایت با اکسیژن، پوشش مناسب و مانیتورینگ کامل
- ۲) آرام سازی بیمار با دارو و لوله گذاری مجدد
- ۳) کنترل گازهای خون شریانی
- ۴) لوله گذاری مجدد

۱۵۱- در صورت خروج ناخواسته لوله تراشه توسط بیمار، کدام اقدام صحیح است؟

- ۱) حمایت با اکسیژن، پوشش مناسب و مانیتورینگ کامل
- ۲) آرام سازی بیمار با دارو و لوله گذاری مجدد
- ۳) کنترل گازهای خون شریانی
- ۴) لوله گذاری مجدد

- ۱۲۲- هر بیمار بعد از پیوسته غیر فعال می شود. کدام اقدام مناسب تر است؟
۱) بیمار است. پس شست و شو و ضد عفونی کردن برای پیشگیری از عفونت وجود یافته باشد.
۲) بیمار کلاه های کوتاه خود را در دستش بگذارد. موکلت از پوشش غیر بهداشتی است.
۳) بیرون بصریت حسیست. از پوشش بهداشتی و غیر بهداشتی استفاده کرد.
۴) در بستاری با کتشن بهداشتی را بپوشاند. باید پوشش بهداشتی داشته شود.
۱۲۳- در رابطه با دوره مراقبت از زخم کدام مورد صحیح است؟
۱) گشایش زخم در پرتو زرد رنگ. زخم استریل از نظر میکروبها آلودگی نیست نه زرد رنگ گلابی دارد.
۲) زخم ترش و زرد رنگ. DVT در پرتو سفید گلابی. زخم از عفونت است.
۳) زخم زرد رنگ گلابی. زخم عفونت. زخمی که زرد رنگ عفونی است.
۴) زخم سفید رنگ. زخم عفونی. زخم زرد رنگ عفونی است نه زرد رنگ گلابی دارد.
۱۲۴- در کدام نوع شکستگی ضربان قلب پایین است؟
۱) تروچی
۲) پروگزیک
۳) هیپوکستیک
۴) گاردیوژیک
۱۲۵- هر پرستاری که تعداد اشباع اکسیژن پایین است و بعد از پیوسته مشکلی است. دستکاری کدام پارامتر صحیح است؟
۱) اشباع ریه
۲) تعداد جاری
۳) PEF
۴) اشباع ششهای بازدهی

۴۵

- ۱۲۶- مشاهده های اصلی یک سازمان رسمی کدام است؟
۱) تلاش برای هدف مشخص
۲) تلاش اصلی و قدرت
۳) فعالیت زیر- مربوط به کدام مفهوم مدیریتی است؟
۴) یک سیستم عملیات تنظیم سیستماتیک و مرتبط با یکدیگر که به منظور دستیابی به یک سری اهداف تعیین و مشخص توسط یک نهاد سازمان و با دولت برای یک مدت معین انجام می گیرد.
۱) مدیریت
۲) کنترل و نظارت
۳) برنامه ریزی
۴) سازماندهی
۱۲۷- برنامه سازی رهبری رهبری و بازاریابی مناسب ترین سبک رهبری برای پیروان با شیوه MI کدام است؟
۱) اقتضایی
۲) مشارکتی
۳) مستوری
۴) هدف از حساب رستی مراقبت های پرستاری (Nursing Audit) کدام مورد زیر است؟
۱) محاسبه هزینه مراقبت پرستاری
۲) ارزیابی کیفیت مراقبتی
۳) نظارت بودجه مراقبتی
۴) اولین آموزش برای پرستار تازه استخدام طرحی در بخش پیوند قلب کدام است؟
۱) آشنایی
۲) آشنایی
۳) آموزش مداوم
۴) تعیین خدمت
۱۲۸- در کدام شیوه مراقبت پرستاری کارها سریع تر انجام شده و مناسب بخش هایی است که کمبود پرستار دارند؟
۱) پرستاری (اصلی)
۲) واکسیناسیون
۳) تئوری
۴) موردی
۱۲۹- سوپروایزر بیمارستان «الف» در شیفت عصر برای اطلاع و بررسی عملکرد کارکنان پرستاری به بخش جراحی رفته و علاوه بر گرفتن آمار بیماران و تخت های خالی- بیماران بدحال و بیمارانی که همان روز تحت عمل جراحی قرار گرفتند را از نزدیک و بزرگ می کند. این اقدام سوپروایزر به تنهایی در کدام حیطه مدیریت پرستاری قرار دارد و آیا در ایجاد انگیزه در پرسنل بخش مؤثر است؟
۱) حسابرسی - بله - مؤثر است
۲) هماهنگی - خیر - تأثیر ندارد
۳) هدایت - بله - تأثیر مستقیم دارد
۴) اعتبار بخشی - خیر - تأثیر ندارد



- ۱۵۴- در کدام نشود مراقبت پرستاری، قدرت تشخیص‌دهی پرستار افزایش می‌یابد، ولی نیازمند مهارت کثیر در مهارت و رهبری است؟
 ۱- گروهی
 ۲- تیمی
 ۳- فردی
 ۴- تیمی
- ۱۵۵- پایه و اساس تکنولوژی در کار گمان‌هواکن بهداشتی بیمارستانی کدام است؟
 ۱- توان از استند
 ۲- توان از استند
 ۳- توان از استند
 ۴- توان از استند
- ۱۵۶- هدف پرستاری، سوپرایز و سوپرستارین بیمارستانی در کدام گروه زیر قرار می‌گیرد؟
 ۱- هدف
 ۲- هدف
 ۳- هدف
 ۴- هدف
- ۱۵۷- استفاده نوین روش حمل‌ونقل، کدام است؟
 ۱- تحریره نسبی
 ۲- تحریره نسبی
 ۳- تحریره نسبی
 ۴- تحریره نسبی

در حقیقت چرا می‌باشد

- ۱۶۱- کدام یک از تشخیص‌های پرستاری زیر، صحیح است؟
 ۱- اختلال در صورت عصبی به علت از دست دادن استقلال
 ۲- اختلال در حرکت حرکتی در ارتباط با محدودیت حرکتی
 ۳- تغییر در تعادله به علت حباب ناگهانی
 ۴- نسبی درمانی در ارتباط با سوختن
- ۱۶۲- اگر بخواهیم به بیماری در صفت عملکردی از آگنیز پرستاری، کدام وسیله زیر برای این کار مناسب است؟
 ۱- ماسک ساده
 ۲- کانول بینی (Nasal cannula)
 ۳- ماسک وچری (Venturi mask)
 ۴- ماسک با نسبی مجده بازدمی (Partial rebreather mask)
- ۱۶۳- هدف از تشویق بیمار به مصرف مایعات، بعد از جراحی قلبه صدری، کدام است؟
 ۱- تشویق از تشویق
 ۲- تشویق از تشویق
 ۳- تشویق از تشویق
 ۴- تشویق از تشویق
- ۱۶۴- حفظ تعادل مایعات بدن
 ۱- تشویق از تشویق
 ۲- تشویق از تشویق
 ۳- تشویق از تشویق
 ۴- تشویق از تشویق
- ۱۶۵- کدام ضایعه ثانویه پوستی است که به علت تولید بیش از حد کلانین ایجاد می‌شود و موجب خیراتروپی بافت استخوانی و برجستگی نامنظم آن می‌گردد؟
 ۱- دلمه (Crust)
 ۲- قشقی شدن (Scales)
 ۳- تشویق از تشویق
 ۴- تشویق از تشویق
- ۱۶۶- تشخیص ترین شکل ضایعه پوستی در پیوریا سی، کدام مورد است؟
 ۱- لکه‌های گرد که سطح آن، با پوسته‌های پرمای پوشیده شده
 ۲- ناول‌های مریضه و زخم‌های تشکیل شده بر روی آنها
 ۳- دستهای از وریکول‌های برجسته در روی دست و پا
 ۴- ضایعات پوستی به تعداد کم بر سر تن بدن
- ۱۶۷- بعد از عمل هیستروکتومی، نشستن طولانی مدت بیمار، ابتلا به بروز چه خطری را بیش می‌آورد؟
 ۱- غنوت
 ۲- خونریزی
 ۳- تشویق از تشویق
 ۴- تشویق از تشویق
- ۱۶۸- در مراقبت پس از کونیزاسیون، کدام مورد صحیح است؟
 ۱- عدم استفاده از کاندوم، به هنگام مقاربت
 ۲- خارج کردن یک واژینال
 ۳- تشویق از تشویق
 ۴- تشویق از تشویق

- ۱۶۸- در جراحی واریکوسل، مهم‌ترین مراقبت کدام است؟
 (۱) کنترل ۱۸°C بیمار
 (۲) بررسی جوشکاری سیستماتیک
 (۳) دادن پمپ بسته به بیمار به مدت ۴ ساعت
 (۴) استفاده از گشادخوار و منقبض در ساعت اول
- ۱۶۹- در هیپوکالمی، مهم‌ترین تدبیر پرستاری کدام است؟
 (۱) رژیم پرستار از پتاسیم
 (۲) محدودیت مصرف پتاسیم
 (۳) مصرف پتاسیم
 (۴) استفاده از مدرها
- ۱۷۰- توصیه به تنفس آرام در یک سیستم بسته (مانند پاکت کاغذی)، از تدابیر پرستاری کدام احتیاج اسید باز است؟
 (۱) اسفنج تنفسی
 (۲) الکالوز تنفسی
 (۳) اسفنج متابولیک
 (۴) اسیدوز متابولیک

